

Результаты. Обследование включало выполнение цистоскопии. У 6 женщин при цистоскопии выявлена лейкоплакия мочевого пузыря. Основным методом лечения являлось оперативное вмешательство, которое сводилось к симультанной электрорезекции участков лейкоплакии слизистой и влагалищной транспозиции наружного отверстия уретры по методу Комякова, т.е. выходное отверстие уретры перемещается чуть выше места его расположения, на 1-1,5 см ближе к клитору. Тем самым, во время полового акта снижается вероятность его инфицирования и возникновения посткоитального цистита или уретрита. Непосредственный результат хороший. Наблюдение в течение 1 года – прекращение эпизодов развития посткоитального цистита.

Выводы. Диагноз позволял подтвердить характерные жалобы и анамнез заболевания, а также осмотр с проведением специального теста ОДоннел-Хиршхорна, позволившего выявить дистопию уретры, оценить степень смещения наружного отверстия уретры во влагалище. В нашем случае единственным эффективным методом лечения хронического цистита стало оперативное лечение по методу Комякова.

Литература

1. Нестеров, С. Н. Реконструкция уретры в лечении посткоитального цистита / С.Н. Нестеров, М.С. Аскарлов, В.В. Рогачиков // Медицинский журнал Западного Казахстана. – 2009. – № 2 (22). – С. 82–86.

КОМПЛЕКСНЫ АНАЛІЗ АНАТАМІЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ ЖАНОЧАЙ ПАЛАВОЙ СІСТЭМЫ

Тамілава П. Дз.

*Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Беларусь
Навуковы кіраўнік – выкладчык Божска Т. В.*

Актуальнасць нашага даследавання вызначана неабходнасцю вывучэння анатамічнай тэрміналогіі ў навучанні будучых урачоў, таму важнае месца ў падрыхтоўцы медыка мае ролю правільнага прымянення розных тэрмінаў. Аб'ектам нашага даследавання з'яўляецца анатамічная тэрміналогія жаночай палавой сістэмы. У нашай навуковай працы мы прапануем агляд і прымяненне карысных, на наш погляд, відаў аналізу лексічных адзінак пры комплексным вывучэнні асобнага раздзела анатамічнай тэрміналогіі: статыстычны, марфалагічны, структурны, кампаратыўны, этымалагічны.

У якасці крыніц для нашага даследавання паслужылі: падручнік «Анатомія чалавека» М. Г. Прывесы, «Анатомическая терминология женской половой системы» Т. А. Смірновай і інш., «Анатомический словарь: белорусско-латинский, латинско-белорусский» С. П. Ярашэвіча і інш., «Атлас анатомии человека» Р. Д. Сінельнікава.

Галоўная мэта работы заключаецца ў комплексным аналізе анатамічных тэрмінаў у беларускай, лацінскай і англійскай мовах, для дасягнення якой неабходна вырашыць наступныя задачы: скласці беларуска-лацінска-англійскі слоўнік-пералік анатамічных тэрмінаў жаночай палавой сістэмы; параўнаць тэрміналагічныя структуры анатамічных найменняў і апісаць асноўныя мадэлі анатамічных тэрмінаў; выканаць статыстычныя падлікі у азначанай галіне анатамічнай тэрміналогіі з мэтай вызначэння: частотнасці выкарыстання часцін мовы (назоўнік, прыметнік, дзеепрыметнік); агульнай колькасці слоў, якія ўдзельнічаюць ва ўтварэнні тэрмінаў; выканаць этымалагічны аналіз лацінскіх і англійскіх тэрмінаў; вызначыць найбольш часта ўжываемыя словаўтваральныя элементы лацінскай тэрміналогіі.

Вынікі работы. Мы сабралі і сістэматызавалі тэрміны жаночай палавой сістэмы ў слоўніку-пераліку, які ўключае 403 беларускія тэрміны з лацінскімі і англійскімі адпаведнікамі. Мы палічылі аднаслоўныя, двухслоўныя, трохслоўныя і г. д. тэрміны. Так, шасціслоўныя тэрміны апынуліся толькі ў англійскай мове, таму што у беларускай і лацінскай ім адпавядаюць чатырохслоўныя і пяціслоўныя тэрміны. Апісалі асноўныя мадэлі анатамічных тэрмінаў і вызначылі іх граматычныя і марфалагічныя асаблівасці. Устанавілі, што сярод англійскіх тэрмінаў пераважаюць словы лацінскага паходжання, асноўныя словаўтваральныя мадэлі лацінскіх тэрмінаў абмяжоўваюцца трыма спосабамі: суфіксальны, суфіксальна-прэфіксальны і складанне асноў.

ЭНДОМЕТРИОЗ: ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

Тевель В.Я.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – ассистент, к.м.н. Смолей Н.А.*

Актуальность. Согласно данным литературы, эндометриозом страдает каждая десятая женщина репродуктивного возраста. В структуре гинекологической патологии эндометриоз занимает третье место, сопровождается хронической тазовой болью и часто приводит к бесплодию [1].

Цель – провести анализ клинического течения и эффективности разных методов лечения эндометриоза у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы исследования. Проанализировано 56 историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в гинекологическом отделении УЗ «ГКБ № 4 г. Гродно» по поводу эндометриоза. Исследование включало в себя анамнез и длительность заболевания, оценку локализации патологического очага, клинических проявлений, эффективности консервативного лечения и объема выполненных оперативных вмешательств.