

Методы. В данном исследовании использован семантико-логический метод, который базируется на принципе использования словарных толкований, метод упорядочения терминологии на основе ее инвентаризации (выделены и описаны структура терминов) и анализа (рассмотрены структурные особенности терминов), метод сплошной выборки и сравнительно-сопоставительный метод.

Результаты и выводы. Анализ русских и английских терминов, обозначающих опухоли органов эндокринной системы, позволил сделать вывод о преобладании полилексемных онкотерминов в русском и английском языках, а терминоэлемент «-ома/-ома» является опорным элементом многочисленных моноксемных терминов, поскольку он соотносится с понятием «опухоль», являющимся ключевым в данной области. Из 129 русских онкотерминов, обозначающих опухоли органов эндокринной системы, 82 полилексемных и 47 моноксемных. Процентное соотношение моноксемных и полилексемных терминов в русском языке составляет 36:64. Процентное соотношение простых и сложнопроизводных терминов составляет 47:53, 22 простых, 25 сложных. Таким образом, в русском языке наиболее распространенными среди моноксемных терминов являются сложнопроизводные. Процентное соотношение моноксемных и полилексемных терминов в английском языке составляет 27:73. Изучение моноксемных терминов позволило отметить, что в английском языке процентное соотношение простых и сложнопроизводных терминов составляет 30:70, 3 простых и 7 сложных. Моноксемные термины были разделены на 3 группы: простые, аффиксальные и сложные.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ГОРТАНИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ (ПО МАТЕРИАЛАМ КЛИНИКИ ЗА ПЕРИОД 2007- 2017гг)

Хоров А.О., Бондарчук Ю.М.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – д.м.н., проф. Хоров О.Г.*

Актуальность. Среди злокачественных опухолей верхних дыхательных путей рак гортани является наиболее часто встречаемым заболеванием. Удельный вес рака гортани составляет 3-5,6% среди всех онкологических заболеваний и от 38 до 65% в структуре ЛОР онкологических [1].

Цель – анализ эпидемиологии рака гортани среди пациентов, подвергшихся органосохраняющим операциям в Гродненской области.

Материалы и методы исследования. Нами проведен ретроспективный анализ 98 медицинской документации и канцер-регистра пациентов, которым выполнялось органосохраняющее хирургическое лечение по поводу рака

гортани в период с 2007 по 2017 гг на базе оториноларингологического гнойного отделения для взрослых в УЗ «ГОКБ» г. Гродно. Выбор объема оперативного вмешательства происходил после ряда исследований: непрямой ларингоскопии, МСКТ органов шеи, УЗИ лимфатических узлов и мягких тканей шеи, УЗИ органов брюшной полости, осмотра опухоли во время операции.

Результаты. По результатам нашего исследования среди 98 пациентов: женщин – 2 (2,0±9,9%), мужчин – 96 (98,0±1,4%). Средний возраст 58±1,2 лет. Рак гортани констатировался в возрастной группе от 30 до 39 лет – в 4 (4,1±2,0%) случаях, от 40 до 49 лет – в 19 (19,4±4,0%) случаях, от 50 до 59 лет – в 39 (39,8±4,9%) случаях, от 60 до 69 лет – в 25 (25,5±4,4%) случаях и более 70 лет – 11 (11,2±3,2%) пациентов. Жители города преобладали над жителями села: 63 (64,3±6,0%) городских и 35 (35,7±8,1%) сельских жителей. Среди 98 пациентов курящими были 93 (94,9±2,3%), злоупотребление алкоголем было отмечено у 42 (42,9±7,6%) человек. Наиболее часто рак гортани встречался у лиц следующих профессий: водитель, механизатор, рабочий, строитель, сторож. У 41 (41,8±5,0%) пациента диагностирована опухоль T1N0M0, у 57 (58,2±5,0%) – T2N0M0. Гистологическая структура опухоли была представлена: плоскоклеточный рак – 25(25,5±4,4%), плоскоклеточный рак с ороговением – 62 (63,3±4,9%), плоскоклеточный рак без ороговения – 11 (11,2±3,2%).

Выводы. Наши исследования показали, что среди поступивших на лечение пациентов преобладали мужчины в 98,0±1,4% случаях. Жители города преобладали над жителями села. Курение и злоупотребление алкоголем в значительной степени повышают риск развития рака гортани.

Литература

1. Океанов А.Е., Моисеев П.И., Левин Л.Ф., под ред. О.Г. Суконко Статистика онкологических заболеваний в Республике Беларусь (2006-2015). – Минск: РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, 2016. – С.280.

РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С КОСТНЫМИ КИСТАМИ

Хотим О.А.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., доцент Аносов В.С.*

Актуальность. Костная киста – это псевдокиста, остеолитическое образование, возникающее преимущественно в детском возрасте (5-15 лет), занимает 3 место среди всех первичных костных образований и составляет от 21 до 57% от всей костной патологии у детей [1].

Цель – обследование детей с костными кистами.