

варикозно-расширенных вен абдоминального отдела пищевода и дна желудка из-за сегментарной портальной гипертензии), у 3 (23,1%) – гастродуоденальной артерии, у 2 (15,4%) – панкреатодуоденальной артерии. У 10 (76,9%) пациентов была клиника желудочно-кишечного кровотечения, что требовало экстренных оперативных вмешательств. Троем пациентам (23,1%) выполнена эмболизация артерий по поводу стационарной аневризмы.

Результаты. Ангиоэмболизация артерии парапанкреатического русла оказалась эффективной у 13 (100%) пациентов, что было подтверждено результатами контрольных ангиограмм. 7 (53,8%) пациентам потребовалось выполнение радикальных операций на поджелудочной железе в «холодном периоде» с хорошим и удовлетворительным результатом лечения.

Выводы. Применение внутрисосудистой эмболизации при патологии сосудов парапанкреатической зоны в лечении осложнений хронического панкреатита является перспективным и эффективным методом временного или окончательного гемостаза.

Литература

1. Ревишвили А. Ш. Эндovasкулярные вмешательства в хирургии поджелудочной железы / А. Ш. Ревишвили, А. Г. Кригер и др. // Журнал им. Н. И. Пирогова. 2018. – № 4. – С. 4-16

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОУБИЙСТВА

Зверко О. И., Холопица Ю. В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – д-р мед. наук, доцент Сурмач М. Ю.

Актуальность. В связи с наличием множества различных факторов и многочисленностью путей, ведущих к суицидальному поведению, усилия по предупреждению самоубийств требуют широкого многосекторального подхода к разным слоям населения, группам риска и ситуациям на всех этапах жизни человека. [1]

Цель. По данным опроса выявить возможность предотвращения самоубийств и определить пути предупреждения возникновения суицидальных мыслей у человека.

Материалы и методы исследования. В рамках программы медико-социологического исследования по профилактике суицида был проведен случайный бесповторный опрос 200 человек Гродненской, Минской и Брестской областей. Из них 115 (57,5%) женщин и 85 (42,5%) мужчин репродуктивного возраста. Средний возраст составил $33,8 \pm 10,4$ лет. Из всех респондентов 56,5% состояли в браке, 60,5% – имели как минимум одного ребенка. 71,0% респондентов являлись городскими жителями, 29,0% –

сельскими. Высшее образование имело 30% выборки.

Для работы использовался разработанный опросник, отражающий наиболее важные аспекты проблемы суицида.

Результаты. 60% респондентов считают, что всегда есть возможность предотвратить самоубийство, 19,5% думают, что попытки совершения суицида можно только отсрочить на некоторое время.

29% опрошенных утверждают, что всегда по поведению человека можно узнать о его суицидальных мыслях, 45% думают, что не во всех случаях можно заподозрить суицидальные намерения.

Основными способами отвлечения мыслей, по мнению опрошенных, являются помощь психолога (43,5%), смена обстановки (27,5%), новый круг общения (10,0%), новое хобби или увлечения (9,5%).

Удержать человека от суицида, по словам респондентов, может любовь к близким (43,0%), страх смерти (18,5%), вероисповедание (6,5%), 28,5% затруднились ответить на этот вопрос.

Выводы. Население репродуктивного возраста считает, что всегда есть возможность предотвратить суицид, основным способом достижения данной цели является помощь психолога и поддержка со стороны близких людей.

Литература

1. Предотвращение самоубийств. Глобальный императив. Всемирная организация здравоохранения, 2014.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУИЦИДА КАК СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Зверко О. И., Холопица Ю. В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – д-р мед. наук, доцент Сурмач М. Ю.

Актуальность. Суицид является одной из основных проблем человечества, характеризующейся многоаспектностью и сложным взаимодействием внешних и внутренних причин. Актуальность исследования проблемы суицида обуславливается также масштабностью распространения данных негативных явлений в обществе, зависимостью от общих социальных процессов, причин и условий. [1]

Цель. По данным опроса выявить отношение населения репродуктивного возраста к проблеме суицида в современном обществе: определить мнение населения о причинах, о факторах, провоцирующих самоубийство, о возможностях предупреждения и о личном опыте в данной области.