

года. Всем пациентам проводилась предоперационная подготовка. Всем пациентам выполнена резекция прямой или сигмовидной кишки.

**Результаты.** Биохимические показатели (общий белок, мочеви́на, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ) исследовались на биохимическом анализаторе «Mindray BS-300» производства Китай, параметры коагулограммы на гемоккоагулометре «ACL-10000» производства США. Исследования свёртывающей системы крови проводились в объёме определения протромбинового времени, уровня фибриногена, активированного частичного тромбинового времени, МНО и активности протромбинового комплекса.

**Выводы.** 1. Оперативные вмешательства усиливают коагуляционный потенциал крови у онкологических пациентов. 2. Комбинированная профилактика (механическая и медикаментозная) является эффективной и достаточной для профилактики тромбоэмболических осложнений в периоперационный период.

#### *Литература*

1. Connolly G.C., Khorana A.A. Emerging risk stratification approaches to cancer-associated thrombosis: risk factors, biomarkers and a risk score. *Thromb Res.* 2010. Apr; 125 Suppl. 2: S1.
2. American Society of Clinical Oncology Guideline: recommendations for venous thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer. *Journal of Clinical oncology / Volume 25. Number 34. December. 2007.*
3. Минимальные клинические рекомендации Европейского общества медицинской онкологии (ESMO). Перевод – коллектив авторов. М. 2008.

## **ГЕНДЕРНЫЕ МОТИВЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ**

**Попека О. С., Гончарук И. А.**

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра психиатрии и наркологии

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Станько Э. П.

**Актуальность.** Особую социальную значимость в настоящее время несет увеличение заболеваемости алкоголизмом среди женской части населения. Существующие методы профилактики и реабилитации не всегда учитывают гендерные особенности пациентов с зависимостью от алкоголя [1, 2]. Вместе с тем, изучение мотивов употребления алкоголя в зависимости от пола даст возможность создания и использования более эффективных мер профилактики и реабилитации пациентов с зависимостью от алкоголя [3].

**Цель.** Изучить мотивы употребления алкоголя и характерные черты личности у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя в зависимости от половой принадлежности.

**Материалы и методы исследования.** Обследован 41 пациент с синдромом зависимости от алкоголя, находившийся на стационарном лечении в организациях здравоохранения г. Гродно и г. Пинска (73% мужчин и 27%

женщин), средний возраст которых составил 44,2 года, средняя длительность злоупотребления — 8,9 года. В исследовании использовались опросник «Мотивация потребления алкоголя», личностный опросник FPI, методика Шварца «Изучение ценностей личности».

**Результаты.** Сравнительный анализ полученных результатов показал, что ведущими мотивами употребления алкоголя у 30% мужчин были традиционные (9,2), 40% – атактические (8,1), 7,4% – псевдокультурные (7,2). Ведущими у 54% женщин установлены атактические (9,7), 11% – гиперактивации (9,5) и гедонистические (9,1) мотивы, что говорит о значимости высокой тревожности и алкогольных традиций в патогенезе алкогольной зависимости. Ведущими ценностями, вне зависимости от пола установлены доброта (30%) и безопасность (30%), у женщин – достижение (30%). Личностный профиль мужчин отличался более высоким уровнем реактивной (42,3%) и спонтанной (38%) агрессивности, женщин – раздражительности (66%) и невротичности (55%).

**Выводы.** Мотивационная направленность приема алкоголя и личностные черты пациентов с алкогольной зависимостью зависят от их половой принадлежности, что следует учитывать при планировании профилактических мероприятий и лечебных воздействий.

#### *Литература*

1. Гофман, А. Г. Клиническая наркология / А.Г. Гофман. – 2-е издание. – М.: МИА, 2017. – 376 с.
2. Маслова, М. В. Мотивы употребления ПАВ в подростковом возрасте / М. В. Маслова, Т. И. Кузнецова // Молодой учёный. – 2015. – № 6. – С. 783-789.
3. Шабанов, П. Д. Наркология / П. Д. Шабанов. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2015. – 560 с.

## **АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ГЕПАТО-ПАНКРЕАТО-ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ**

**Попко Д. В., Юш М. С.**

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ложко П. М.

**Актуальность.** Ежегодно возрастающее количество впервые выявленных заболеваний со стороны органов гепато-панкреато-дуоденальной зоны (ГПДЗ), а также осложнений, связанных с ними, свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения вопроса. Данная тенденция наблюдается среди лиц различных возрастных групп, при этом всё чаще страдают лица молодого возраста. Ежегодно только по поводу желчнокаменной болезни (ЖКБ) проводится более 2.5 млн холецистэктомий [1]. Золотым стандартом является