

женщин), средний возраст которых составил 44,2 года, средняя длительность злоупотребления — 8,9 года. В исследовании использовались опросник «Мотивация потребления алкоголя», личностный опросник FPI, методика Шварца «Изучение ценностей личности».

Результаты. Сравнительный анализ полученных результатов показал, что ведущими мотивами употребления алкоголя у 30% мужчин были традиционные (9,2), 40% – атарактические (8,1), 7,4% – псевдокультурные (7,2). Ведущими у 54% женщин установлены атарактические (9,7), 11% – гиперактивации (9,5) и гедонистические (9,1) мотивы, что говорит о значимости высокой тревожности и алкогольных традиций в патогенезе алкогольной зависимости. Ведущими ценностями, вне зависимости от пола установлены доброта (30%) и безопасность (30%), у женщин – достижение (30%). Личностный профиль мужчин отличался более высоким уровнем реактивной (42,3%) и спонтанной (38%) агрессивности, женщин – раздражительности (66%) и невротичности (55%).

Выводы. Мотивационная направленность приема алкоголя и личностные черты пациентов с алкогольной зависимостью зависят от их половой принадлежности, что следует учитывать при планировании профилактических мероприятий и лечебных воздействий.

Литература

1. Гофман, А. Г. Клиническая наркология / А.Г. Гофман. – 2-е издание. – М.: МИА, 2017. – 376 с.
2. Маслова, М. В. Мотивы употребления ПАВ в подростковом возрасте / М. В. Маслова, Т. И. Кузнецова // Молодой учёный. – 2015. – № 6. – С. 783-789.
3. Шабанов, П. Д. Наркология / П. Д. Шабанов. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2015. – 560 с.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ГЕПАТО-ПАНКРЕАТО-ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Попко Д. В., Юш М. С.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Ложко П. М.

Актуальность. Ежегодно возрастающее количество впервые выявленных заболеваний со стороны органов гепато-панкреато-дуоденальной зоны (ГПДЗ), а также осложнений, связанных с ними, свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения вопроса. Данная тенденция наблюдается среди лиц различных возрастных групп, при этом всё чаще страдают лица молодого возраста. Ежегодно только по поводу желчнокаменной болезни (ЖКБ) проводится более 2.5 млн холецистэктомий [1]. Золотым стандартом является

лапароскопическое вмешательство, однако возможна и лапаротомия.

Цель. Провести анализ заболеваемости органов ГПДЗ в различных возрастных группах и методов хирургического лечения на основании данных историй болезни за 2017 год из архива Гродненской областной клинической больницы (ГОКБ).

Материалы и методы исследования. Выполнен статистический анализ данных 142 историй болезни за 2017 год из архива ГОКБ.

Результаты. Было выделено 4 возрастные группы: лица молодого возраста (МВ) (от 18 до 44 лет), среднего возраста (СВ) (от 45 до 59 лет), пожилого возраста (ПВ) (от 60 до 74 лет), старческого возраста (СтВ) (от 75 до 90 лет). Средний возраст пациентов составил 56 лет. Из 142 исследуемых 31% составили мужчины и 69% – женщины. Средняя продолжительность нахождения в стационаре (СПНС) лиц МВ и СВ составила 11 суток, ПВ и СтВ – 17 суток. Злокачественные новообразования (ЗН) органов ГПДЗ среди лиц МВ встречались в 1 случае, СВ – в 5 случаях, среди лиц ПВ и СтВ в 7 и 8 случаях соответственно. Доля высокотехнологичных оперативных вмешательств (ВТО) независимо от возраста составила 73%. В 29 случаях была произведена лапаротомия, из них в 25 случаях у лиц ПВ и СтВ. В 20 случаях была выполнена конверсия в лапаротомию.

Выводы. СПНС лиц ПВ и СтВ на 7 суток больше, чем лиц МВ и СВ. Среди лиц ПВ и СтВ заболеваемость ЗН органов ГПДЗ выше и составила 71,4 % от общей заболеваемости ЗН. В группах лиц ПВ и СтВ лапаротомия проводилась в 5 раз чаще, чем у лиц МВ и СВ. В большинстве случаев (73%), независимо от возраста, производились ВТО. В 20 случаях (14,2%) была произведена конверсия.

Литература

1. Иоскевич, Н. Н. Практическое руководство по клинической хирургии: Болезни пищеварительного тракта, передней брюшной стенки и брюшины/ Н. Н. Иоскевич; под редакцией П. В. Гарелика – Минск.: Выш. шк., 2001. – 685 с.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ СРЕДИ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Попко Д. В., Бердовская Ю. Д.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель – ст. преподаватель Головкова Е. В.

Актуальность. Глобальный характер и сложность лечения сальмонеллёзной инфекции обусловлены множественностью источников и вариабельностью путей распространения, многообразием клинических форм. В