

го воздействия, отравления, покушением на жизнь со стороны сожительницы (80%), ревности (20%), у женщин – бредом отношения и преследования. Среди эмоциональных расстройств у мужчин преобладали раздражительность (50%) и сниженный фон настроения (65%), у женщин – тревога (71%) и страх (57%).

Вывод. Клиническая картина алкогольного делирия в зависимости от пола имеет определенные особенности. Выявленные у мужчин и женщин клинические особенности алкогольного делирия могут быть терапевтическими мишенями для лечебного воздействия.

Литература

1. Наркология : национальное руководство / Под ред. Н.Н. Иванца, И.П. Анохиной, М.А. Винниковой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 720 с.
2. Бачериков, Н.Е. Клиническая психиатрия / Н.Е. Бачериков. – Киев : «Здоровья», 1989. – 512 с.

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННЫХ

Бурак Е.А.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., доц. Гурина Л.Н.*

Актуальность. Нарушения ритма сердца у младенцев составляют 1–2% в структуре заболеваемости детей первых месяцев жизни. Трудности диагностики нарушений ритма сердца у новорожденных диктуют определение факторов риска, срыва сердечной деятельности.

Цель:изучить течение беременности матерей, у детей которых в перинде новорожденности диагностированы нарушения сердечного ритма.

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 35 историй болезни новорождённых с нарушениями сердечного ритма, которые находились на лечении и обследовании в Гродненской областной детской клинической больнице.

Результаты. В результате проведенного исследования было выявлено, что нарушение ритма сердца у новорожденных проявлялось экстрасистолией в 65,9% случаев, пароксизмальной тахикардией – 14,3%, АВ-блокадами у 11,43% детей, другие нарушения сердечного ритма составили 8,55%.

Анализ материнского анамнеза показал, что осложнения течения беременности были диагностированы у 97% обследованных. Беременность с угрозой прерывания наблюдалась у 25,7% женщин. Хроническая фетоплацентарная недостаточность развилась у восьми матерей (22,85%), многоводие у трех беременных (8,6%). Гестоз диагностирован в 17,1% случаев.

Экстрагенитальная патология была у 50% женщин. Заболевания ЛОР-органов и органов дыхания выявлены у 26,0% обследуемых, хроническая герпетическая инфекция на фоне беременности встречалась у 8,6%

женщин, в 14,3% случаев беременность сочеталась с анемией. Генитальная инфекция диагностирована у 17,1% беременных.

Заключение. Таким образом, изучение материнского анамнеза позволило определить показатели пренатального периода, которые имеют тесную взаимосвязь с заболеваниями периода новорожденности. Течение беременности на фоне угрозы прерывания, хронической фетоплацентарной недостаточности, гестоза, анемии, инфицирования герпетической инфекцией, заболеваний верхних дыхательных путей и ЛОР органов оказывает неблагоприятное воздействие на плод и приводит к нарушению сердечного ритма у новорожденного.

Литература

1. Шарыкин, А.С. Перинатальная кардиология: руководство для педиатров, акушеров, неонатологов / А. С. Шарыкин. – С. 274

ОЦЕНКА РИСКА ЗИМНЕЙ ДЕПРЕССИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Бурлыко А.Ю., Кучерова С.А.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Зиматкина Т.И.*

Актуальность. Зимняя депрессия является экологически обусловленным и связанным с недостатком солнечного света нарушением здоровья. В дальнейшем это может привести к развитию депрессии, проявляющейся в чувстве вины, безысходности и несчастья, отчаяния, безнадёжности, снижению самооценки, неспособности испытывать положительные эмоции, повышенной раздражительности, уровня тревоги и напряжения. Сезонное аффективное расстройство представляет собой серьёзную проблему, которая снижает качество жизни и не позволяет человеку нормально жить, способствует социальной изоляции, развитию зависимостей, суицидальным мыслям и поведению, проблемами с учёбой. В связи с чем, актуально выявление и профилактика данного нарушения здоровья.

Цель исследования: изучить степень подверженности зимней депрессии студентов третьего курса медико-психологического факультета

Материалы и методы. Исследование проводили методом анкетирования, в котором принимали участие 45 студентов третьего курса медико-психологического факультета мединститута в возрасте 19-21 год.

Результаты. Установлено, что у 29,4% респондентов имеются признаки зимней депрессии, 22,5% оказались в группе риска, а у 48.1% отсутствует риск возникновения данного нарушения здоровья. У тех, кто подвержен зимней депрессии или имеет риск ее развития, наблюдаются: расстройства настроения (его перепады, грустные мысли, потеря уверенности в себе, пессимизм во взглядах на будущее), пищевого поведения (увеличение потребления углеводной и сладкой пищи, алкоголя), нарушения сна (неглубокий, поверхностный сон, бессонница) когнитивных функций