

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ НАРУШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Лисок Е.С.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра общей гигиены и экологии

Научный руководитель – д-р мед. наук, доцент Наумов И.А.

Актуальность. В здравоохранении Республики Беларусь заняты около 40 тысяч врачей, среди которых абсолютное большинство составляют женщины репродуктивного возраста. Среди них в связи с полифакторным воздействием вредных производственных факторов одной из выраженных групп риска по ухудшению состояния здоровья являются врачи акушеры-гинекологи [1]. Поэтому изучение состояния заболеваемости с временной утратой трудоспособности (далее – ВУТ) данного контингента медицинского персонала с выявлением возможных профессиональных рисков является весьма актуальным [2].

Цель, задачи и методы исследования. Оценить состояние заболеваемости с ВУТ женщин-врачей акушеров-гинекологов репродуктивного возраста в связи условиями труда. Состояние заболеваемости с ВУТ 22 женщин-врачей акушеров-гинекологов Гродненского областного клинического перинатального центра в возрасте 23-49 лет изучено на основании анализа данных государственной статистической отчетности (форма 16-ВН) за период с 2011 по 2015 годы. Условия труда оценены по итогам проведенной аттестации рабочих мест. Результаты исследований обработаны с применением пакета прикладных программ Statistica 6.0.

Результаты и выводы. Установлено, что условия труда врачей акушеров-гинекологов по степени вредности и/или опасности факторов производственной среды и трудового процесса относились к вредным (класс 3.3). При этом наибольший вклад в формирование данного показателя внесли высокая напряженность трудового процесса и наличие на рабочих местах вредных производственных факторов биологической природы, которые в конечном итоге определяли уровни заболеваемости с ВУТ по ряду основных классов болезней данного контингента женщин.

Так, при анализе заболеваемости с ВУТ (в случаях) среди женщин-врачей акушеров-гинекологов репродуктивного возраста установлено, что среднее значение показателя за рассматриваемый период составило $13,03 \pm 5,953$ на 100 работниц. В структуре заболеваемости с ВУТ (в случаях) преобладали осложнения беременности и родов, доля которых составила 29,03%. Кроме того, значительными оказались болезни костно-мышечной системы, составлявшие 12,92%, болезни мочеполовой системы – 11,07%, а также болезни органов дыхания 10,61%, что характерно для длительного профессионального воздействия факторов биологической природы и высокой напряженности трудового процесса, выявленных нами при изучении условий труда.

Таким образом, условия труда женщин-врачей акушеров-гинекологов в значительной мере определяют характер заболеваемости с временной утратой трудоспособности, что требует разработки эффективных профилактических мероприятий

Литература:

1. Бектасова, М. В. Влияние факторов профессионального риска на заболеваемость медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений / М. В. Бектасова, Е. А. Кобецкая, М. В. Полякова // Здоровье. Медицинская экология. Наука. – 2010. – Т. 41–42, № 1–2. – С.20.
2. Косарев, В. В. Труд и здоровье медицинских работников / В. В. Косарев, С. А. Бабанов // Терапевт. – 2009. – № 6. – С. 31–36.