

сознания и клиническая смерть в самых тяжелых случаях. По данным Национального статистического комитета РБ, в период 2010 по 2014 год наблюдается снижение уровня заболеваемости наркоманией и токсикоманией. По данным на 2014 год, количество пациентов с впервые установленным диагнозом составило 15,1 на 100 000 человек. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в г. Минске, на втором месте находится Гродненская область, самые низкие показатели заболеваемости зарегистрированы в Брестской области.

Выводы. Разрушительные последствия спайсов изучены не до конца. Так как наркотик появился недавно, нельзя точно сказать, какие изменения ожидают организм через 15-20 лет. Однако уже сейчас понятно, что курение смесей не пройдет безболезненно и последствия будут самыми печальными.

Литература

1. Зобнин Ю.В., Стадлер Е.М. Острые отравления синтетическими каннабиноидами. Сибирский медицинский журнал. 2014 № 8. С.-130-135.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Китель С.О.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель - к.филол.н., доц. Кондратьев Д.К.*

Объектом проводимого исследования являются, в широком аспекте, немецкие и русские клинические термины, включающие в свой состав греко-латинские терминологические элементы, и в узком аспекте – конечные греко-латинские терминоэлементы. Медицинская клиническая терминология, по самым разным оценкам, насчитывает до 60 тысяч терминов, количество греко-латинских терминологических элементов составляет свыше 1500, количество конечных терминоэлементов превышает 90.

Цель данного исследования – проведение полной инвентаризации немецких и русских конечных греко-латинских терминоэлементов и их сравнительного лексико-семантического анализа.

В проведенном исследовании использованы описательный метод, метод инвентаризации и анализа. Для описания количественных характеристик медицинских терминов использован метод математической статистики.

Материалом исследования явились основные словари медицинских терминов, используемые в отечественной и немецкой медицинской практике: Pschyrembel Klinisches Wörterbuch (Berlin : de Gruyter)- 1735 страниц, около 60 тысяч немецких медицинских терминов, и Энциклопедический

словарь медицинских терминов : В 3-х томах – более 60 тысяч русских медицинских терминов.

В результате проведенного исследования:

Проведен анализ более чем 60 тысяч немецких и такого же количества отечественных медицинских терминов, взятых из основных словарей медицинских терминов, выделено свыше 90 конечных греко-латинских терминологических элементов русского и немецкого языков.

Составлен полный «Русско-немецкий медицинский словарь конечных греко-латинских терминоэлементов» с этимологической справкой, примерами и статистикой употребления.

Сделан сравнительный лексико-семантический анализ конечных греко-латинских терминологических элементов в отечественной и немецкой медицинской терминологии.

Выделены основные группы конечных греко-латинских терминологических элементов, выявлены закономерности их написания и употребления.

Дана лингвистическая характеристика понятия «греко-латинский терминоэлемент» в медицинской терминологии.

Проведенное исследование позволило сделать следующие **выводы**:

Медицинская терминология представляет собой сложную терминологическую систему, имеющую интернациональный характер и, во многих аспектах, структурном, семантическом и количественном, схожую в немецком и русском языках. В то же время, она имеет ряд отличительных особенностей, присущих только немецкому или русскому языку.

«Греко-латинский терминоэлемент» представляет собой наименьшую структурную единицу медицинского термина, не являющуюся морфемой, обладающую особым лингвистическим статусом, функция которой заключается в указании на определенное терминологическое поле, к которому принадлежит построенный из них термин.

Полученные результаты будут использованы при подготовке учебных пособий по клинической терминологии дисциплины «Латинский язык» и учебника “Fachdeutsch. Medizin” для студентов-медиков.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА ГОРТАНИ

Климец Д.С., Шиман О.В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Актуальность. Рак гортани – одно из самых социально негативных заболеваний, поскольку злокачественный процесс затрагивает орган, участвующий не только в дыхании, но и в голосообразовании, что приводит к стойкой социальной дезадаптации. Это подчеркивает важность ранней диагностики заболевания. Среди общего числа пациентов со злокачествен-