

## АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТИ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ, ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ

Бутолина Е.А., Малащук Т.Г.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра патологической анатомии

Научный руководитель – ассист. Бутолина К.М.

**Актуальность.** Злоупотребление алкоголем является важной медико-биологической, а также социальной и экономически значимой проблемой. По данным ВОЗ алкоголизм в структуре причин смерти в мире занимает 3-е место, уступая лишь злокачественным новообразованиям и сердечно-сосудистым заболеваниям. Ежегодно в мире от злоупотребления алкоголем умирает 2,5 миллиона человек, что составляет 6,2% всех смертей мужчин и 1,1% всех смертей женщин. Количество смертельных случаев, связанных с употреблением алкоголя, в РБ находится на достаточно высоком уровне и имеет тенденцию к увеличению, прежде всего, затрагивая лиц трудоспособного возраста.

**Цель исследования:** дать характеристику причин смерти при алкогольной болезни в г. Гродно и Гродненской области по данным патологоанатомических вскрытий. Материалом для исследования явились данные протоколов патологоанатомических вскрытий за 2012-2014 гг. из архива УЗ «ГОПАБ».

**Результаты.** За анализируемый период было выявлено 529 случаев смерти, связанных со злоупотреблением алкоголем, что составило 5,8% всех вскрытий. Из них в 2012 году был 171 случай, в 2013 - 236 случаев, в 2014 - 122 случая. В стационарах области умер 371 (70%) больной, вне стационара - 158 человек (30%). Возраст умерших колебался от 24 до 77 лет (средний возраст –  $52,8 \pm 9,6$  лет). Мужчин было 436 (82%) (средний возраст -  $52,6 \pm 9,7$  лет), женщин – 93 (18%) (средний возраст –  $53,6 \pm 9,2$  лет). В трудоспособном возрасте умерли 358 (68%) человек: 315 мужчин (72% всех мужчин) и 43 женщины (46% всех женщин).

279 (53%) умершим был выставлен диагноз хронического алкоголизма, 188 (35%) - алкогольной болезни, а 62(12%) человека умерли от острого отравления этиловым алкоголем.

Во всех наблюдениях у умерших, злоупотреблявших алкоголем, отмечалось алкогольное поражение сердца, которое было представлено дилатационной кардиомиопатией. Однако лишь в 84 (18%) случаях выставлялся основной диагноз алкогольной кардиомиопатии. Печеночная форма алкогольной болезни отмечалась в 241(52%) случае. При этом в 225 (48,5%) наблюдениях диагностировался цирроз печени, в 9(2%) случаях – алкогольный гепатит и в 7(1,5%) случаях – жировой гепатоз. Алкогольное поражение поджелудочной железы выявлено в 12 (2%) случаях в виде обострение хронического панкреатита с развитием панкреонекроза. В 46 (10%) случаях на первый план выступала алкогольная энцефалопатия. Полиорганные поражения в основном диагнозе указывались у 84 (18%) умерших.

Непосредственной причиной смерти в 51 случае (11%) стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, в 28 (6%) наблюдениях – хроническая сердечная недостаточность и в 5 (1%) – тромбоэмболия легочной артерии, которые явились осложнением алкогольной кардиомиопатии. В 123 случаях (26%) пациенты умерли от печеночной недостаточности, в 78 случаях (17%) – от кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. У 11 умерших (2%) развился эндотоксический шок при панкреонекрозе, а у 1 – кровотечение в полость кисты поджелудочной железы и брюшную полость. В 79 (17%) наблюдениях основным механизмом смерти явился токсический отек головного мозга. Иммунодефицит при длительном злоупотреблении алкоголем в 91 (19%) наблюдении способствовал развитию пневмонии, ставшей причиной смерти.

**Вывод.** Доля заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголя, в структуре причин смерти за анализируемый период относительно невелика. Основное количество умерших от алкогольной болезни составили мужчины трудоспособного возраста. Ведущими поражениями при этом были алкогольный цирроз печени и алкогольная кардиомиопатия.