Результаты и обсуждение.Процедура TIPS выполнялась с использованием набора Cook (Ирландия) -TIPSS-100.

В послеоперационном периоде на амбулаторном этапе констатировано значительное уменьшение объемов асцита, отсутствие эпизодов кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, отсутствие прогрессирования печеночной энцефалопатии на фоне приема препаратов лактулозы, а также субъективное улучшение качества жизни пациентки. По показаниям через 7 месяцев в Республиканском научно-практическом центре трансплантации органов и тканей выполнена ортотопическая трансплантация печени с благоприятным исходом.

Выводы.TIPS у пациентов с внутрипеченочной формой потальной гипертензии, ассоциирующейся с варикозным расширением вен пищевода и желудка и резистентным к консервативной терапии асцитом, является высокотехнологичным, малоинвазивным, легко переносимым и эффективным пособием. Требует дальнейшего изучения вопрос показаний и выбора оптимальных сроков его выполнения у данной категории пациентов с учетом прогностических факторов течения заболевания.

Литература

1. Siramolpiwat, S. Transjugular intrahepatic portosystemic shunts and portal hypertension-related complications / S. Siramolpiwat // World J Gastroenterol. – 2014. – Vol. 20, N45. – P.16996-17010.

ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВУ ЖЕНЩИН С ДИФФУЗНЫМ ЗОБОМ

Рапекта И.В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель –к.м.н., ассистент Смолей Н.А.

Актуальность. В настоящее время патология щитовидной железы – одна из самых распространенных в мире. В Республике Беларусь первичная заболеваемость зобом составляет около 102 на 100 тыс. человек. Нарушение функции щитовидной железы приводит к осложненному течению гестационного процесса, повышая частоту аномалий развития плода и невынашивания [1, 2].

Цель. Проанализировать течение беременности, родов и частоту развития осложнений у женщин с диффузным зобом.

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ 80 историй родов женщин, которые были разделены на 2 группы. Контрольную группу определили пациенты с физиологически протекающей беременностью (20), основную группу – 60 человек с диффузным зобом.

Результаты.Средний возраст женщин составил 25,9±1,04 года. У всех женщин контрольной группы беременность была доношенной и роды произошли в срок 281,09 дней. В то же время у 18,3% пациентов основной группы имели место преждевременные роды, причиной которых явилось

Репозиторий ГрГМУ

преждевременное излитие околоплодных вод и инфекция. Фетоплацентарная недостаточность была диагностирована в 61,7% случаев и проявилась признаками внутриутробной гипоксии плода и синдромом задержки внутриутробного развития плода. Каждой третьей пациентке основной группы (37%) потребовалось экстренное родоразрешение: в 7 случаях по поводу острой гипоксии плода, в 11 – по поводу слабости родовых сил, в 4 – преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. Данные осложнения во время беременности и родов свидетельствуют о взаимосвязи системы мать-плацента-плод-щитовидная железа и подтверждают данные литературы [1, 2].

Выводы. Патология щитовидной железы приводит к развитию многочисленных осложнений во время беременности и родов, что требует своевременной диагностики и адекватного лечения.

Литература

1. Сидорова, И. С. Беременность и эндокринная патология / И. С. Сидорова, И. О. Макаров, Е. И. Боровкова. – 2-е изд. – М. : Практ. медицина, 2009. – 144 с.

2. Glinoer, D. The regulation of thyroid function during normal pregnancy : importance of the iodine nutrition status / D. Glinoer // Best. Pract. Res. Clin. Endocr. Metab. – 2004. – Vol. 18, № 2. – P. 133-152.

ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Реут О.С., Мещенок М.В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель – ассистент Бутолина К.М.

Актуальность. Инфекционные заболевания во всем мире остаются важнейшей проблемой. От них, по данным ВОЗ, ежегодно умирает 16 млн. человек. Инфекционные и паразитарные заболевания занимают 3-4 место в структуре детской заболеваемости и смертности в мире и в Республике Беларусь в частности.

Цель работы. Дать характеристику причин смерти от инфекционных заболеваний у детей первого года жизни по данным вскрытий Гродненского областного патологоанатомического бюро за 2010 - 2014 годы.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования стали протоколы вскрытий. Результаты обработаны статистически.

Результаты. Анализ протоколов вскрытий детей первого года жизни показал, что от инфекционной патологии в возрасте 0-6 дней умерло 18 (39,1%) человек (14 мальчиков и 4 девочки), 7-28 дней - 13 (28,3%) человек (10 мальчиков и 3 девочки), 29 суток – 1 год - 15 (32,6%) человек (8 мальчиков и 7 девочек). Всего за первый год жизни от инфекционных заболеваний умерло 46 детей, что составило 27,9% вскрытий детей первого года жизни. 28 (60,9%) детей родились недоношенными. У 13 (28,3%) человек

Репозиторий ГрГМУ