

УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О МЕРАХ ЗАЩИТЫ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ

Сабалевская Ю. И., Езерская А.Ю.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно
Научный руководитель: д.м.н., проф. Тищенко Е.М.

Актуальность: Клещевой энцефалит является эндемичным заболеванием для Республики Беларусь и протекает в лихорадочной, менингеальной, реже менингоэнцефалитической форме. Впервые описаны два серологически подтвержденных случая полиомиелоэнцефалитической формы клещевого энцефалита, зафиксированных в Республике [1]. Достоверных сведений о невосприимчивости к вирусу клещевого энцефалита той или иной части населения нет [2]. Инфекция наиболее распространена в Республике Беларусь в юго-западных (Брестский) и западных (Гродненский) регионах [3].

Цель: Изучить грамотность населения в вопросах о мерах предосторожности от укусов клещей.

Материалы и методы: За весенне-летний период 2015г. проведено анонимное анкетирование 100 жителей Гродненской области в возрасте от 22 до 60 лет. Объектами исследования явились жители д.Лосево, д.Лихачи, д. Озёры, д. Вертелишки Гродненского района, д. Збойск, Ивьевского района, а также жители г.Гродно. Средний возраст респондента составил 39,9±0,18 года. Статистический анализ результатов исследования проводили с помощью пакета Statistica 6.0, платформы GoogleForms.

Результаты исследований: В ходе исследований установлено, что выше уровень знаний в вопросе о мерах предосторожности в лесопарковых зонах, имеют респонденты из г. Гродно, в возрасте 30–45 лет. Самым опасным в эпидемиологическом отношении определен сезон апрель/май (44,4%), август/сентябрь (36,8%). На вопрос о мерах о соблюдении правил безопасности при посещении лесов, боров, парков два из трех респондентов указало на использование защитной одежды и головных уборов, каждый третий применение защитных средств (кремов, спреев). Не считают необходимостью использование каких-либо средств индивидуальной защиты от клеща 10% опрошенных. Абсолютное большинство (82,5%) анкетированных информированы об опасности клещей, как переносчиков инфекции опасных для человека, однако 14,2% считают укус клеща безвредным. Порядка 61,2% респондентов правильно ответили на вопрос о клинических проявлениях клещевого энцефалита. В качестве основных источников информации по данной проблеме выступают: участковый врач (47,9%) средства массовой информации (44,6%), научно-популярная литература (27,3%), интернет (24,8%).

Выводы: Население г. Гродно и области в целом достаточно ознакомлено с мерами защиты от клещей, но нуждается в периодических консультациях с медицинскими работниками целью уменьшения количества людей не использующих индивидуальных средств защиты.

ОТНОШЕНИЕ К ЛИЦАМ, ОБРАТВИШИМСЯ ЗА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Савко Е.Е.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра психиатрии и наркологии
Научный руководитель-д.м.н., проф. Тищенко Е.М., к.м.н., доц. Карпюк В.А.

Актуальность. Многие полученные пациентами травмы ведут к снижению уровня физической и социальной активности, что, в свою очередь, является катализирующим фактором для усугубления психического здоровья пациента и может являться пусковым фактором для развития психического заболевания.

Цель исследования. Изучить информированность пациентов травматологических отделений об возможности оказания им психотерапевтической помощи.

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 180 респондентов. Средний возраст анкетированных составил 37.5 ± 0.5 лет. Анкетирование осуществлено по разработанной нами анкетой, состоящей из 28 открытых вопросов. Социальные категории распределились следующим образом: 74%-работающие, 16%-пенсионеры, 10%-не работают. 72% опрошенных проживают в городе, 28% в сельской местности. 68% опрошенных составляют женщины, 32 % мужчины. Обработку статистических данных проводили с помощью программы Microsoft Excel.

Результаты. Три из пяти (58,8%) респондентов информированы об возможности оказания психотерапевтической помощи, а 41.2 %-нет. 61.7 % респондентов доверяет врачам-психотерапевтам. 70.2% знают где, в случае необходимости, возможно получение психотерапевтической помощи. 40.7% респондентов будут предвзято относиться к лицам, если бы им было заранее известно что они обращались за консультацией к врачу-психотерапевту. 7 % респондентов может обидеть совет лечащего врача обратиться за консультацией к психотерапевту. 86% опрошенных знают в чём заключается работа врача-психотерапевта. 67% анкетированным известна разница между врачом психиатром и психотерапевтом. 83% считают что работу врача-психотерапевта может выполнить психолог в организации предоставляющей работу.

Выводы. Респонденты информированы об содержании и условиях оказания психотерапевтической помощи, но с настороженностью относятся к лицам, обратившимся за ней.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ «ГЛАЗАМИ» ПАЦИЕНТОВ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ

Савко Е.Е.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,

кафедра психиатрии и наркологии

Научный руководитель-д.м.н., проф. Тищенко Е.М., к.м.н., доц. Карпюк В.А.

Актуальность. Многие полученные пациентами травмы ведут к снижению уровня физической и социальной активности, что, в свою очередь, является катализирующим фактором для усугубления психического здоровья пациента и может являться пусковым фактором для развития психического заболевания. Мощному моральному воздействию подвергаются также члены семьи пациентов травматологических отделений.

Цель исследования. Изучить субъективное отношение к аспектам психотерапевтической помощи пациентов травматологического отделения.

Материалы и методы. Проведено анкетирование 180 респондентов. Анкетирование было проведено по разработанной нами анкетой, состоящей из 28 открытых вопросов. Средний возраст анкетированных составил 37.5 ± 0.5 лет. Социальные категории распределились следующим образом: 74%-работающие, 16%-пенсионеры, 10%-не работают. 72% опрошенных проживают в городе, 28% в сельской местности. 68% опрошенных составляют женщины, 32 % мужчины. Обработку статистических данных проводили с помощью программы Microsoft Excel.

Результаты. 82% считает нужным оказание психотерапевтической помощи пациентам с тяжёлыми травмами. (84%) столько же указывает на необходимость оказания психотерапевтической помощи семьям пациентов, получивших тяжёлые травмы. При этом, 7 % респондентов может обидеть совет лечащего врача обратиться за консультацией к психотерапевту. 78% назвали возможным пройти сеанс психотерапии в случае рекомендации врача, 12% затруднились ответить. У 4% респондентов был опыт в обращении за психотерапевтическим консультированием, из них в 71% случаев этот опыт был позитивным. 91 % респондентов хотел бы проводить психотерапевтические консультации на базе травматологического отделения. В случае необходимости посещать в дальнейшем сеансы психотерапии после окончания лечения в травматологическом отделении готовы 76% респондентов. 38.2 % респондентов считают возможным после выписки из стационара дальнейшие психотерапевти-