

При выписке из стационара у 7,6% пациентов отмечено выздоровление, в 87,8% - улучшение, в 4,0% без существенных перемен и в 0,6% - ухудшение, существенно не различаясь при ЯЖ и ЯДПК.

#### **Выводы:**

1. ЯЖ и ЯДПК составляют 3,3% среди острой патологии брюшной полости, сопровождающейся госпитализацией

2. Выявлены статистически достоверные различия ( $p < 0,05$ ) в уровне госпитализации пациентов с ЯЖ и ЯДПК в зависимости от пола, возраста, сезона года, нозологической формы, что может быть использовано для принятия управленческих решений по улучшению качества медицинской помощи исследуемому пациенту.

#### **Литература:**

1. Клиническая эффективность комбинированного антихеликобактерного лечения больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки Н.В.Кирина, Н.И., Бодруг, С.И.Буторов / и др. // Клиническая медицина. – 2003. – №1. – С. 37-39.
2. Маев, И.В. Современные принципы лечения кислотозависимых заболеваний И.В.Маев, Е.С.Вьючнова, Е.Б.Грищенко, // Клиническая медицина. – 2003. – №1. – С.56–57.
3. Шаймарданов, Р.Ш. Гастроэнтерография в диагностике пилородуоденальных язв / Р.Ш.Шаймарданов, В.Н.Биряльцев, В.А.Филиппов // Клиническая медицина. – 2003. – №1. – С.45–47.

## **ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ О ПРОФИЛАКТИКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

Хороших Е.П., Мыстковская В.П.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Научный руководитель – д.м.н., проф. Тищенко Е.М.

**Актуальность.** Опыт, накопленный в последние годы, показывает, что остановить нарастание патологии тканей и органов полости рта одними лечебными мероприятиями невозможно. Нужно проводить также профилактику основных стоматологических заболеваний, что в значительной степени снижает уровень их распространенности и интенсивности[2].

**Целью исследования** явилось изучение информированности молодежи и доступности информации о профилактике здоровья зубов.

**Материалы и методы:** Нами проведено анкетирование 111 студентов колледжа мужского пола в возрасте 18-20 лет, которые когда-либо обращались за стоматологической помощью. Респондентам предлагался краткий опросник, состоящий из 30 вопросов.

**Результаты.** Состоянием здоровья своих зубов очень удовлетворены 9,9%, больше половины опрошенных (60,4%) им удовлетворены, вариант «ни то ни другое» выбрал каждая четвертый респондент (26,1%), 3,6% опрошенных не удовлетворены. Половина респондентов (54%) утверждают, что при посещении стоматолога им даны дополнительные рекомендации и брошюры, однако двум из пяти (40,5%) анкетированных не предлагались дополнительные рекомендации и брошюры, а 5,5% затруднились ответить. Рекомендации после лечения у стоматолога соблюдают 46,9% опрошенных, 42,3% - соблюдают, но не полностью, 8,1% рекомендации не соблюдают. Двум из трех (57,7%) при посещении стоматолога не предлагались дополнительные рекомендации по уходу за зубами, 36,9% - предлагались, 5,4% - затруднились ответить. Каждому второму (52,3%) опрошенному требуется дополнительная помощь и демонстрация навыка правильной чистки зубов, 39,6% - не требуется, 8,1% - затруднились ответить.

**Выводы.** Важно, чтобы профилактическая направленность в деятельности врача-стоматолога проявлялись повседневно, независимо от вида профессиональной деятельности. В этой связи неперемное условие успешной работы заключается в повышении санитарной культуры населения путем усиления санитарно-просветительной работы.