

# ТЯЖЕСТЬ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

*Седушкина В.В.*

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  
Научный руководитель - ст. пр. кафедры Ассанович М.В.*

**Актуальность.** У пациентов с шизофренией отмечается высокая распространенность никотиновой зависимости: от 80% до 88% из них являются курильщиками (в общей популяции от 28% до 40%). Пациенты, страдающие шизофренией, характеризуются более выраженной зависимостью от никотина, особенно в период прохождения лечения в стационарных условиях.

**Цель исследования.** Определение тяжести никотиновой зависимости у пациентов с шизофренией в зависимости от клинической формы и типа течения расстройства.

## **Материалы и методы исследования.**

Обследовано 23 пациента мужского и женского пола с диагнозом шизофрения, проходивших курс лечения в стационарных отделениях УЗ ГОКЦ «Психиатрия-наркология». Среди них: мужчин – 18 (78,3%), женщин – 5 (21,7%). Возрастной диапазон: от 26 до 74 лет. Диагноз «параноидная форма шизофрении» был выставлен 21 пациенту, «кататоническая форма шизофрении» – 2 пациентам. У 16 (69,6%) пациентов отмечался непрерывный тип течения заболевания, у 7 (30,4%) пациентов – эпизодический тип течения. Длительность заболевания составила: у 7 (30,4%) пациентов – менее 10 лет, у 9 (39,1%) пациентов – от 10 до 20 лет, у 7 (30,4%) пациентов – более 20 лет. Методы исследования: катamnестический, опросник «Тест Фагерстрема для определения степени никотиновой зависимости», анкетирование с целью сбора социально-демографических данных.

**Результаты.** В результате проведенного исследования выявлено, что все пациенты являлись потребителями никотина. Стаж курения составил: у 3 (13%) пациентов – до 10 лет, у 8 пациентов (34,8%) – от 10 до 20 лет, у 12 (52,2%) – более 20 лет. У 14 (60,9%) пациентов отмечался низкий (0-3 баллов), у 5 (21,7%) пациентов – средний (4-5 баллов), у 4 (17,4%) пациентов – высокий уровень никотиновой зависимости (6 и более баллов). Все 5 пациенток женского пола (100%) продемонстрировали низкий уровень никотиновой зависимости (0-3 баллов). Низкий уровень зависимости установлен у 9 (50%) пациентов мужского пола с непрерывным типом течения заболевания, средний уровень у 5 (27,8%) пациентов мужского пола с непрерывным типом течения, высокий уровень зависимости отмечался у 4 (22,2%) пациентов мужского пола с непрерывным и эпизодическим типами течениями расстройства.

## **Выводы.**

Все обследованные пациенты продемонстрировали наличие никотиновой зависимости. Не установлено связи между тяжестью никотиновой зависимости, клинической формой, типом течения, длительностью заболевания, социально-демографическими характеристиками обследованных пациентов.