

признаны инакурабельными ввиду гангрены тонкой и толстой кишки. У 11 (39,3%) пациентов после диагностической лапароскопии были выставлены показания к лапаротомии ввиду недостаточной информативности исследования, при выполнении которой у 4 больных диагностировано тотальное поражение кишечника. У остальных 29 (50,8%) больных наблюдалась картина распространенного перитонита, в связи с чем оперативное пособие начиналось с лапаротомии. Резекция тонкой кишки различной протяженности (от 60 см до 2,5 метров) была произведена 14 пациентам, в сочетании с правосторонней гемиколэктомией – у 6 больных. Резекция толстого кишечника выполнена у 1 больного. Послеоперационная летальность составила 64% (летальность после резекций кишечника – 14%).

Выводы. При любой патологии со стороны брюшной полости неясного генеза оправдано предположение о наличии ОСНК. Возможности видеолапароскопии при ОСНК в начальную стадию заболевания ограничены. В связи с этим при подозрении на ОСНК показано выполнение лапаротомии - резекции кишечника являются единственным шансом для спасения данного контингента больных.

Литература

1. Шулутко, А.М. Случай ранней диагностики острого тромбоза верхней брыжеечной артерии / А. М. Шулутко и соавт. // Московский хирургический журнал. – 2014. - № 1 (35). – С.35-38.

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ (ОПУХОЛИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ)

Хомич И. Г.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к. филол. н., доцент Гущина Л.Н.*

Актуальность работы обусловлена тем, что еще не проводились аналогичные исследования в области терминологии опухолей органов эндокринной системы. ВОЗ-классификация опухолей органов эндокринной системы от 2007 г. не полностью охватывает терминологию этой системы органов.

Цель исследования – проведение сравнительного структурного анализа подсистем русской и английской терминологий, обозначающих названия опухолей органов эндокринной системы, для установления составляющих их типов терминов в русском и английском языках и для решения таких практических задач, как упорядочение и стандартизация терминов, обозначающих опухоли.

Методы. В данном исследовании использован семантико-логический метод, который базируется на принципе использования словарных толкований, метод упорядочения терминологии на основе ее инвентаризации (выделены и описаны структура терминов) и анализа (рассмотрены структурные особенности терминов), метод сплошной выборки и сравнительно-сопоставительный метод.

Результаты и выводы. Анализ русских и английских терминов, обозначающих опухоли органов эндокринной системы, позволил сделать вывод о преобладании полилексемных онкотерминов в русском и английском языках, а терминологический элемент «-ома/-ома» является опорным элементом многочисленных моноксемных терминов, поскольку он соотносится с понятием «опухоль», являющимся ключевым в данной области. Из 129 русских онкотерминов, обозначающих опухоли органов эндокринной системы, 82 полилексемных и 47 моноксемных. Процентное соотношение моноксемных и полилексемных терминов в русском языке составляет 36:64. Процентное соотношение простых и сложнопроизводных терминов составляет 47:53, 22 простых, 25 сложных. Таким образом, в русском языке наиболее распространенными среди моноксемных терминов являются сложнопроизводные. Процентное соотношение моноксемных и полилексемных терминов в английском языке составляет 27:73. Изучение моноксемных терминов позволило отметить, что в английском языке процентное соотношение простых и сложнопроизводных терминов составляет 30:70, 3 простых и 7 сложных. Моноксемные термины были разделены на 3 группы: простые, аффиксальные и сложные.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ГОРТАНИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ (ПО МАТЕРИАЛАМ КЛИНИКИ ЗА ПЕРИОД 2007- 2017гг)

Хоров А.О., Бондарчук Ю.М.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – д.м.н., проф. Хоров О.Г.*

Актуальность. Среди злокачественных опухолей верхних дыхательных путей рак гортани является наиболее часто встречаемым заболеванием. Удельный вес рака гортани составляет 3-5,6% среди всех онкологических заболеваний и от 38 до 65% в структуре ЛОР онкологических [1].

Цель – анализ эпидемиологии рака гортани среди пациентов, подвергшихся органосохраняющим операциям в Гродненской области.

Материалы и методы исследования. Нами проведен ретроспективный анализ 98 медицинской документации и канцер-регистра пациентов, которым выполнялось органосохраняющее хирургическое лечение по поводу рака