




Союз  
педиатров  
России

# Сборник материалов XVI Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии»

(Москва, 24–27 февраля 2012 г.)



**814**

## **ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ**

**Хоха Р. Н.**

*УО «Гродненский государственный медицинский университет»*

**Актуальность.** Заболевания органов пищеварения у детей из-за высокой распространенности в последние годы представляют серьезную медико-социальную проблему.

**Цель исследования:** анализ заболеваемости болезнями органов пищеварения детей г. Гродно и Гродненской области, структуры и их динамики.

**Пациенты и методы.** Анализ заболеваемости, структуру, динамику по классу болезни органов пищеварения (код по МКБ 10 пересмотра K00-K92) у детей в возрасте от 0 до 17 лет проводили на основании ежегодных отчетов кабинета медицинской статистики УЗ «ДОКБ» г. Гродно.

**Результаты.** Анализ проведен с 2008 г. по 2010 г. Установлено, что за анализируемый период отмечается тенденция к снижению общей заболеваемости. Так, например, в 2008 г. она составила 82,3, а в 2010 г. – 76,8 на 1000 детского населения. Структура общей заболеваемости в течение 3 лет остается одинаковой. Преобладающими в структуре общей заболеваемости течение 3 лет являются хронический гастрит, дуоденит (2008 г. – 28,6, 2010 г. – 25,3 на 1000); болезни полости рта слюнных желез, челюстей (2008 г. – 22,5, 2010 г. – 23,4 на 1000); болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей (2008 г. – 10,4, 2010 г. – 10,2 на 1000). Анализ динамики структуры заболеваемости за анализируемый период показал, что в 2010 г. по сравнению с 2008 г. уменьшилась общая заболеваемость детей хроническим гастритом, дуоденитом с 28,6 на 1000 до 25,3 на 1000 детей, в 2 раза увеличилась общая заболеваемость холелитиазом. В 2008 г. она составляла 0,06 на 1000; а в 2010 г. стала 0,12 на 1000 детей.

**Заключение.** Общая заболеваемость болезнями органов пищеварения детей г. Гродно и Гродненской области в 2010 г. составляет 76,8 на 1000 детей.

В структуре общей заболеваемости детей преобладают хронический гастрит, дуоденит; болезни полости рта, слюнных желез, челюстей; болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей.

В течение 3 лет снизилась общая заболеваемость детей хроническим гастритом, дуоденитом и увеличилась общая и первичная заболеваемость холелитиазом. Последнее требует проведения мероприятий по выявлению факторов риска развития этого заболевания уже в детском возрасте.