

44% детей накануне заболевания перенесли инфекцию и получали антибактериальную (15,2%) терапию, либо нестероидные противовоспалительные средства (28,8%).

Выводы.

1. В 95,1% случаев тромбоцитопения являлась основным диагнозом.

2. 44% детей накануне манифестации настоящего заболевания перенесли инфекцию и принимали антибактериальные препараты или нестероидные противовоспалительные средства.

ОСОБЕННОСТИ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ

Ярошевич А.В., Андралойть Е.М.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Жлобич М.В.*

Актуальность. Рак тела матки (РТМ) занимает 1-е место в структуре онкогинекологической заболеваемости в странах Европы и, как и рак молочной железы, может быть отнесен к «болезням цивилизации». Заболевание преимущественно диагностируют у женщин в постменопаузе старше 60 лет. В патогенезе развития РТМ большое значение имеет наличие у женщины метаболического синдрома, в связи с чем, особый научный интерес представляет группа пациенток с нарушением жирового обмена и РТМ.

Цель. Изучение особенностей клинического течения и морфологической характеристики злокачественных новообразований тела матки у пациенток в зависимости от массы тела.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ данных медицинских амбулаторных карт 100 пациенток с раком эндометрия, проходивших лечение в Гродненском областном онкологическом диспансере в период с 2015 по 2017 год.

Результаты. Нами было установлено, что средний возраст у пациенток с РТМ составил 61,8 лет (от 33 до 83). У большинства (88%) опухоль была диагностирована в 1 стадии. 93 женщины на момент постановки диагноза были в постменопаузе. При изучении гистологической структуры опухолей установлено, что в 94% случаев имела место эндометриоидная аденокарцинома.

Для проведения дальнейшего анализа пациентки были распределены на две группы в зависимости от индекса массы тела (Европейские стандарты). В первую группу были включены пациентки с нормальной массой тела и предожирением (47%). Женщины с 1, 2 и 3 степенями ожирения (53%) составили вторую группу. Такие заболевания, как артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет (СД), у пациенток второй группы встречались в два

раза чаще. Так АГ страдали 17 женщин (37%) из первой группы и 47 (70%) из второй. Сахарным диабетом болели только 2 женщины без ожирения (4%). В обеих группах злокачественная опухоль была диагностирована на ранних стадиях - у 44 человек без ожирения (93%) и у 51 женщины с ожирением (96%). Обращает внимание более высокая степень дифференцировки опухоли у женщин с наличием ожирения. Так у 53% женщин из второй группы опухоли были высокодифференцированными, тогда как в первой группе таких было только 38%.

Выводы. В большинстве случаев (более 90%) рак эндометрия диагностируют в постменопаузе у женщин старше 60 лет. Независимо от массы тела опухоль в 93-96% выявляют в начальных стадиях. Наличие ожирения у пациенток с РТМ ассоциируется с более высокой дифференцировкой опухоли, что позволяет предположить более благоприятный прогноз течения заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАКА ТЕЛА МАТКИ У ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ

Ярошевич А.В., Андралойть Е.М.

*Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – к.м.н., ассистент Жлобич М.В.*

Актуальность. Ежегодно в мире раком тела матки заболевают более 160 000 женщин. Рак тела матки занимает 1-е место в структуре онкогинекологической заболеваемости в странах Европы и, как и РМЖ, может быть отнесен к «болезням цивилизации». Заболевание преимущественно диагностируется у женщин в постменопаузальном периоде (старше 60 лет). Особый научный интерес представляет группа женщин, заболевших РТМ, с избыточной массой тела и ожирением [1].

Цель – анализ клинико-морфологических особенностей рака тела матки у женщин в зависимости от массы тела.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 100 пациенток с раком эндометрия, проходивших лечение в ГОКБ в период с 2015 по 2017 год.

Результаты. Нами было установлено, что средний возраст у пациенток с раком тела матки составил 61,75 лет. У большинства (88%) опухоль была замечена в 1 стадии. 93% (93 человека) на момент постановки диагноза были в постменопаузе. У 94% (94 пациентки) был диагностирован эндометриоидный рак. Для проведения анализа пациентки распределены на две группы в зависимости от индекса массы тела (Европейские стандарты). 1-я группа – пациентки с нормальной массой тела и предожирением (47%). 2-я группа –