

PRZYPADKI ALERGII NA METALE SĄ CZĘSTE W KAŻDYM WIEKU

Krzysztof Buczyłko

NZOZ Centrum Alergologii w Łodzi

Epidemiologia i klinika. Układowy Zespół Alergii Niklowego (UZAN) może stanowić ważny stan alergologiczny. Własna praktyka autora (KB) wskazuje na bardzo częste współistnienie objawów skórnych oraz jelitowych. Najczęściej odnotowywano objawy gastroenterologiczne, następnie skórne oraz inne symptomy uogólnione. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry w populacji dziecięcej jest znacznie częstsze niż wcześniej sądzono, a ostatnie doniesienia wskazują, że pozytywne odczyny płatkowe dotyczą od 14 do 70% badanych w wieku 1-18 lat.

Patogeneza: Nikiel (Ni) jest główną przyczyną alergii kontaktowej na metale. Wzbudza in vitro produkcję cytokin zarówno typu Th1 jak i Th2, podobnie jak inne metale: kobalt-Co, chrom-Cr, pallad-Pd, złoto-Au.

Diagnostyka. Emocje budzi wiek, w jakim wolno diagnozować alergię kontaktową. Heine i wsp., opisali 87 dzieci w śr. wieku 2-3 lat, najmłodszy pacjent miał 6 miesięcy. My diagnozujemy od 2 m-ca!

Przypadki: 1) W.P. lat 79 złamanie przezkrętarzowe kości udowej lewej zespolone płytą kątową i śrubami AO. Test: Ni +++++, wyprysk w wycinku śródoperacyjnym – typ IV. Zrost: brak. Odczyn skóry- bz. 2) KB lat 10, wyprysk uogólniony. Z wywiadu: nienawidzi owsianki i kakao, nie lubi czekolady, ani mocnej herbaty, nie czyta gazet. Test Ni+++ . Co++. 3) B.J. lat 7 odczulany skutecznie podjęzykowo trawy, w CA zgłosił swędzące wysypki bez zajęcia zgięć stawowych. TRUE test: Co+++ i neomycyna+ +. 4) ANTOŚ 10 mcy. Pierwotne dng AZS końcowe AKZS Ni+++.

Wnioski: Główne fenotypy alergii kontaktowej na nikiel wg K Buczyłko: Miejscowe kontaktowe zapalenie skóry, Rozsiane kontaktowe zapalenie skóry, Układowy zespół alergii niklowej.

OBLICZA ATOPII- NOS

Krzysztof Buczyłko

NZOZ Centrum Alergologii w Łodzi

Występowanie alergicznego nieżytu nosa(ann) dotyczy 18,2% populacji, a w połączeniu z zapaleniem spojówek-20,5% [Cibella 2015] W Polsce wartość ta jest nieco wyższa. Gdy objawy ann występują cały rok badamy roztocza (RKZ), naskórki lub zespół pyłkowo-pokarmowy. W alergii roztoczowej, pleśniowej, odzwierzęcej, zawodowej 74% ma umiarkowaną lub ciężką postać, 97% - co najmniej dwa objawy, 36%