

В результате проведенного исследования получены следующие выводы:

1) прагматический анализ функционирования английских прилагательных показывает, что при описании вкуса используют: сравнения (50%), метафоры (15%), фразеологизмы (15%), конверсия (13%), идиомы (7%); для русских прилагательных соответственно – сравнения (45%), метафоры (35%), идиомы (10%), фразеологизмы (7%), конверсия (3%);

2) самыми употребительными эпитетами вкуса в английском языке являются *'tasty', 'sweet' и 'spicy'*; для русского языка соответственно – *'горький', 'солёный', 'сладкий' и 'кислый'*;

3) в ходе семантического анализа определен набор из 9-ти сем, согласно которому одна сема – 'наличие вкуса' – интегральная, а остальные 8 сем – дифференциальные, уточняющие значение, выраженное интегральной семой;

4) ядро семантического поля 'вкус' включает больший процент прилагательных русского языка, чем английского;

5) 60% исследуемых прилагательных имеют положительную коннотацию.

Литература:

1. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.ruscorpora.ru/search-main/html>: Дата доступа: 11. 09.2014.

2. British National Corpus [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.natcorp.ox.ac.uk>: Дата доступа: 11. 01.2015.

ОБРЕМЕНЁННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Воронец А.В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра психиатрии и наркологии

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Бойко С.Л.

Актуальность. Категория органических психических расстройств (ОПР) объединяет состояния, характеризующиеся психологическими и поведенческими отклонениями, связанными с транзиторными или постоянными дисфункциями мозга. Психопатологические проявления отражают разрушение мозговых структур или нарушения их обмена веществ. Наиболее характерным признаком ОПР являются когнитивные нарушения. Учитывая, что во многих странах 35-45% случаев невыхода на работу связано с проблемами психического здоровья, а также более 40% всех хронических заболеваний приходится на долю психических, неоспоримо, что именно расстройства психической сферы (а среди них важнейшая отдельно взятая причина – ОПР) – это весомый фактор утраты здоровья.

Цель работы: определить эпидемиологическую обстановку по ОПР среди населения Гродненской области Республики Беларусь за период 2002-2013 гг.

Задача работы: выявить тенденции в динамике показателей заболеваемости и болезненности ОПР.

Исследование выполнено при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований в рамках темы «Оценка медико-

социального бремени органических психических расстройств» (договор №М14М-082 от 23 мая 2014 г.).

Методы исследования. Для анализа заболеваемости и болезненности ОПР за единицу наблюдения был принят каждый случай ОПР в течение 2002-2013 гг. По анализу динамики эпидемиологических показателей за 2002-2013 гг. определены тенденции распространения рассматриваемой патологии. Изучаемые контингенты разделены на группы по полу и по возрасту (40-59 лет, старше 60 лет); рассчитаны следующие характеристики каждого специального интенсивного показателя: коэффициент наглядности, абсолютный прирост, 1% прироста, темп прироста.

Результаты. Средние уровни заболеваемости ОПР населения 40-59 лет и после 60 лет составили 169,5 и 648,6, средние коэффициенты наглядности (КН) – 87,7 и 157,5, КН по отношению к 2002 году – 86,96 и 86,44, значения абсолютных приростов – -0,71 и 48,56, 1% прироста – 1,68 и 6,22, значения относительных приростов – 1,54 и 8,57, соответственно. Интенсивные показатели распространенности ОПР среди населения 40-59 лет и среди лиц старше 60 лет характеризовались следующим образом: средние показатели болезненности составили 865,9 и 2737,5 на 100 тысяч населения, КН – 63,93 и 127,6, КН по отношению к 2002 году – 73,54 и 117,05, значение абсолютного прироста – -56,92 и 100,56, 1% прироста – 8,77 и 26,91.

Выводы. Распространенность ОПР зависит от возраста, наблюдается четкое снижение болезненности и заболеваемости ОПР у лиц 40-59 лет, увеличение – в группе лиц 60 лет и старше. Снижение заболеваемости ОПР среди более молодого населения области можно расценить как положительную тенденцию. Ежегодное увеличение числа больных ОПР, по всей вероятности, обусловлено истинным ростом заболеваемости, кроме того, повышением качества диагностики и расширением возможности реабилитации и терапии.

Литература:

1. Евсегнеев, Р.А. Современное состояние и проблемы развития психиатрии пожилого возраста в Республике Беларусь / Р.А. Евсегнеев // Психиатрия. – 2009. – № 1. – С. 98-104.
2. Ткачева, Е.И. Функционирование системы здравоохранения Республики Беларусь в изменяющихся экономических условиях / Е.И. Ткачева // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. – 2012. – №4. – С.27-31.

АНАЛИЗ ИНВАЛИДНОСТИ В СВЯЗИ С ОРГАНИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Воронец А.В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра психиатрии и наркологии

Научный руководитель – к.м.н., доц. Бойко С.Л.

Актуальность. Инвалидность и инвалидизация населения являются важными показателями общественного здоровья и имеют не только медицинское, но и социально-экономическое значение. Инвалидность является одним из исходов заболеваний, который во многом зависит от уровня и объема медицинских услуг, качества диагностики. В тоже время органические психиче-