

опросника функциональной шкалы нижних конечностей (ФШНК) (Binkley 1999) [1]. Также выполнена оценка значений гликированного гемоглобина (HbA1c). Все пациенты (n=58) в зависимости от результатов опросника разделены на 3 группы: группу 1 (n=13) составили пациенты с неудовлетворительными результатами, согласно данных опросника, группу 2 (n=36) – с удовлетворительными результатами, группу 3 (n=9) – пациенты с СД без СДС. Все пациенты сопоставимы по полу, возрасту, стажу СД 2 типа и индексу массы тела.

Результаты. ФШНК позволяет оценить ограничения в повседневной физической активности, связанные с состоянием нижних конечностей. Самый низкий средний балл ($15,1 \pm 5,8$) по ФШНК выявлен у пациентов из 1-ой группы, средний балл ($30,2 \pm 15,9$) соответствовал 2-ой группе, в 3-ей группе – $33,1 \pm 12,8$ ($p > 0,1$). В то же время средний балл ФШНК в группе пациентов с неудовлетворительными исходами лечения был ниже, чем в обеих других группах сравнения ($p < 0,025$). Уровень HbA1c наименьший зарегистрирован в группах 2 и 3 при сравнении с группой 1 ($7,3 \pm 0,66\%$ и $7,1 \pm 0,91\%$ против $9,19 \pm 0,78\%$, $p < 0,03$ и $p < 0,03$).

Выводы. Результаты исследования позволяют заключить, что применение органосохраняющей тактики у пациентов с СД 2 типа в стадии компенсации с СДС дает возможность сохранить опороспособность нижней конечности и тем самым улучшить качество жизни пациентов в течение длительного времени.

Литература

1. Binkley, Jill M. The Lower Extremity Functional Scale (LEFS) / Jill M. Binkley, Paul W. Stratford, Sue Ann Lott // Scale Development, Measurement Properties, and Clinical Application Physical Therapy. – 1999. – V. 79. – P. 371–383.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗОЖ У СТУДЕНТОВ 1 И 5 КУРСОВ ГрГМУ

Василевич В. В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Третьякевич В. К.

Актуальность. Проблема здоровья студенческой молодежи является сегодня весьма актуальной [1]. Специфика учебного процесса и возрастные особенности позволяют отнести студентов к числу наименее защищенных по отношению к здоровью групп населения. Анализ научной литературы, посвященной здоровью студенческой молодежи, показывает, что их здоровье за время обучения не только не улучшается, но и ухудшается. В этой связи приобретает важное значение обучение принципам здорового образа жизни (ЗОЖ).

Цель. Изучение отношения студентов 1 и 5 курса ГрГМУ к своему здоровью и ЗОЖ.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось социологическим методом с использованием специально разработанной анкеты, в которой было 28 вопросов. В анкетировании приняли участие респонденты – студенты 1 и 5 курсов. Каждый вариант вопроса предусматривал 3, 4 и более вариантов ответа.

Результаты. Состояние своего здоровья оценили как «удовлетворительное» 39,2% опрошенных первокурсников и 37% пятикурсников, «хорошее» – 19,9% и 24% соответственно.

Выводы. Многие обследованные показатели ухудшаются у пятикурсников, несмотря на увеличение количества знаний и доступности информации.

Литература

1. Авчинникова, С. О., Формирование здорового стиля жизни как направление социальной работы // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины, 2006. – №6. – С.25-28.

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ МЕНЕДЖМЕНТЕ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ДИСПАЗИЙ И НЕИНВАЗИВНОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Василькевич М. И., Снежицкая С. П.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра акушерства и гинекологии

Научный руководитель – ассистент Станько Д. Э.

Актуальность. Цервикальные интраэпителиальные неоплазии (CIN) – предрак шейки матки – инициируются вирусами папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) и прогрессируют через форму неинвазивного рака шейки матки (CIS) на фоне персистирующей ВПЧ-инфекции. Ряд авторов отмечают, что вовлечение эндоцервикальных крипт в неопластический процесс ухудшает прогноз заболевания [1].

Цель. Определение особенностей цитологической диагностики и тактики ведения пациенток с CIN и неинвазивным раком шейки матки.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 180 пациенток онкогинекологического отделения УЗ «ГОКБ» в возрасте от 21 до 83 лет с диагнозом CIN-CIS. Диагноз верифицирован во всех случаях после проведения прицельной биопсии и выполненной в последующем конусовидной ампутации шейки матки. Все пациентки путем рандомизации были разделены на 2 группы: в первой – 49 пациенток, которым дополнительно выполнен интраоперационный забор клеточного материала из остаточной порции цервикального канала, во второй – 141 пациентка без интраоперационного