

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ О ПСОРИАЗЕ

Качук Д. Н., Конюшок К. В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра дерматовенерологии

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Новоселецкая А. И.

Актуальность. Псориаз – это один из наиболее часто встречающихся хронических дерматозов, распространенность которого составляет от 2 до 7% населения планеты. Это повсеместно встречающееся заболевание, различия в частоте которого в отдельных этнических группах свидетельствуют о влиянии на его возникновение генетических факторов и факторов окружающей среды. Мужчины и женщины болеют одинаково часто. Так как данное заболевание является хроническим, то оно сильно влияет на качество жизни пациентов.

Цель – изучить степень информированности студентов об некоторых аспектах, связанных с псориазом.

Материал и методы исследования. Для проведения исследования была использована анкета из 26 вопросов. Особое внимание в исследовании уделено рассмотрению аспектов, характеризующих отношение студентов к такому заболеванию, как псориаз, владение студентами базовой информацией по вопросам этиологии, путей передачи псориаза и его осложнений. Были опрошены 570 студентов. Из них 454 студента медицинских университетов и 116 студентов, получающих немедицинское образование. Студентов мужского пола было 23,5%, а женского – 76,5%. Средний возраст респондентов варьировал от 18 до 27 лет. Преобладали лица в возрастной группе от 18 до 20 лет (52,46%).

Результаты. В исследовании уделялось внимание отношению студентов к людям, страдающим псориазом. На вопрос: «Избегаете ли вы общения с людьми, которые болеют псориазом?» – 4,4% ответили: «Да, избегаю». Подобным вопросом стал: «Стали ли вы бы жить вместе с человеком, который болеет псориазом?». На этот вопрос ответы распределились следующим образом: «да» – 47,5%, «нет» – 12,8%, «затрудняюсь ответить» – 39,1%. Также внимание было уделено и знаниям о самом заболевании. Были заданы следующие вопросы: «Заразен ли псориаз?», «Может ли псориаз передаваться по наследству?», «Передаётся ли псориаз половым путём?». При этом заразным считают псориаз 4,4% студентов, затруднились ответить на этот вопрос 17,0%. Ответы на вопрос о передаче псориаза по наследству распределились следующим образом: «да» ответили 62,6% студентов, «затрудняюсь ответить» – 23,5%, «нет» – 13,3%. Среди опрошенных 1,6% студентов считает, что псориаз передается половым путем.

Выводы. Несмотря на доступность информации по псориазу, наблюдается недостаточная информированность среди студентов о причинах

возникновения псориаза. Из-за этого у части опрошенных сформировано неправильное отношение к пациентам с псориазом. По этой причине можно сделать вывод о том, что студенты нуждаются в целенаправленных образовательных программах по знакомству с таким заболеванием, как псориаз.

АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Квач А. П., Вабищевич И. М.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

2-я кафедра детских болезней

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Янковская Н. И.

Актуальность. Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) остается одной из важнейших проблем, так как эти дети определяют уровень перинатальной заболеваемости среди новорожденных.

Цель. Изучение особенностей течения и исхода беременности у женщин, родивших детей с задержкой внутриутробного развития.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 290 карт стационарных пациентов в педиатрическом отделении для новорожденных и недоношенных детей УЗ «ГОКДБ» в период за 2016–2018 гг. Проанализировано течение беременности и исходы родов у 108 женщин, родивших детей со ЗВУР (основная группа), и у 182 женщин, родивших детей с нормальными антропометрическими показателями (контрольная группа).

Результаты. При изучении документации было установлено, что в основной группе 72 (66,67%) ребенка родились с асимметричным вариантом ЗВУР, 36 (33,33%) – с симметричным. Средний возраст матерей, родивших детей со ЗВУР ($27 \pm 0,72$ лет), практически не отличался от возраста матерей в контрольной группе ($28 \pm 0,5$ лет).

У матерей, родивших детей с ЗВУР, беременность протекала на фоне неоднократной угрозы ее прерывания – 43,52%, что достоверно больше чем у женщин контрольной группы 6,15% ($p < 0,01$). Почти в 3 раза чаще у матерей основной группы была диагностирована фетоплацентарная недостаточность – 34 (25,0%), чем в контрольной группе – 11 (6,0%), $p < 0,01$. Беременные женщины обеих групп одинаково часто болели острыми респираторными инфекциями (24,0% и 24,2%, соответственно). Маловодие в основной группе было выявлено у 14 (13,0%) матерей, в контрольной группе – 6 (3,3%). Многоводие в основной группе встречалось у 5 (4,6%) женщин, в контрольной группе – 15 (8,0%). У 13,0% матерей основной группы и 2,75% контрольной отмечена хроническая никотиновая интоксикация ($p < 0,01$). Роды естественным путем достоверно чаще встречались в контрольной группе (77,0%), по сравнению с основной (23,0%).