

В толковом словаре В.И.Даля данное значение указывается первым: «рок, судьба, часть и участь, доля». Понимание счастья как дара богов, благоприятной судьбы, спустя некоторое время преобразовалось в более близкое для восприятия человеком понятие «удачи и успеха». В этой форме оно прочно обосновалось в сознании человека.

Понимание счастья и само понятие «счастье» очень важны в процессе познания. В жизни человека им отведена большая роль, поэтому нужно постоянно углубляться в самую сущность счастья.

Литература:

1. Даль, В.И. / Толковый словарь русского языка, М., 2000

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИХТИОЗА В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ

Островская Н.В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

2-я кафедра детских болезней

Научный руководитель – канд. мед. наук, доц. Гурина Л.Н.

Относительно высокая частота врождённого ихтиоза в общей структуре дерматологической заболеваемости, его персистирующее течение, системный характер поражений, трудности в лечении и низкая эффективность последнего позволяют считать проблему врождённого ихтиоза одной из сложных и актуальных во врачебной практике в целом и педиатрии в частности. Ихтиоз - группа наследственных заболеваний кожи, в основе которых лежат процессы нарушения кератинизации эпидермиса с развитием генерализованного гиперкератоза, напоминающего рыбью чешую.

Целью настоящего исследования явилось изучение течения беременности матерей, у детей которых диагностирован врожденный ихтиоз, определение наследственной предрасположенности врожденного ихтиоза, выделение клинических форм в периоде новорожденности.

Проведен анализ 13 историй болезни формы №112/у новорожденных детей, с врожденным ихтиозом, находившихся на лечении во 2-м педиатрическом отделении для новорожденных и недоношенных детей Гродненской областной детской клинической больницы в период с 2007 по 2014 гг.

Обработка полученных результатов проводилась с помощью методов непараметрической статистики с использованием стандартных компьютерных программ «STATISTICA 6.0», «Microsoft Excel».

Как показало исследование, 12 детей родились доношенными, 1 ребенок – недоношенным, в сроке гестации 32 недели, из них было 6 девочек и 7 мальчиков. Параметры физического развития не выходили за пределы 10 и 90 перцентилей и соответствовали гестационному возрасту. При изучении родословной выявлено, что наследственную отягощенность имел один ребенок, отец которого страдал ихтиозом. У восьми женщин беременность протекала на фоне острых респираторных заболеваний, эрозии шейки матки, гестационного пиелонефрита, острого бронхита, гестоза, у пяти матерей беременность протекала без особенностей. Состояние детей после рождения расценено как тяжелое и среднетяжелое ввиду поражения кожи и неврологической симптоматики. При оценке неврологического статуса отмечался синдром повышен-

ной нервно-рефлекторной возбудимости: болезненный крик, мышечная дистония, мелкокоразмашистый тремор конечностей, спонтанный рефлекс Моро. Пациентам проведено комплексное клинико-лабораторное обследование. На основании клинических проявлений 8 пациентам выставлен диагноз: «Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия» (синонимы: врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия Брока, эпидермолитический ихтиоз). Троим новорожденным – «Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз» (синонимы: ихтиозиформная сухая эритродермия, пластинчатая эксфолиация новорожденных, коллоидная кожа новорожденных, «сальный ихтиоз», универсальная себорея новорожденного). У двоих детей диагностирован – «Простой ихтиоз» (синонимы: обыкновенный ихтиоз, вульгарный ихтиоз).

Выводы. По результатам проведенного исследования определено, что больше половины матерей, у детей которых диагностирован врожденный ихтиоз, имели осложненное течение беременности. Наследственная предрасположенность заболевания прослеживалась у одного пациента, что не совпадает с литературными данными, и возможно обусловлена дебютом многих форм врожденного ихтиоза после периода новорожденности. У новорожденных наиболее часто встречаются тяжелые формы врожденного ихтиоза: «Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия» и «Пластинчатый ихтиоз».

ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКИЕ НЕЙРОНЫ ГИПОТАЛАМУСА КРЫС ПОСЛЕ СЕМИДНЕВНОГО ВВЕДЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

Павлова Д.В., Федина Е.М.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии

Научный руководитель – канд. биол. наук Федина Е.М.

Изучение морфофункционального состояния нейронов гистаминергической системы головного мозга человека и животных при воздействии алкоголем представляется весьма актуальным и значимым направлением. Проведенные к настоящему времени экспериментальные и клинические исследования демонстрируют важную роль данной нейромедиаторной системы в развитии патологических изменений в организме в условиях алкогольной интоксикации [1, 2].

Цель исследования: оценка влияния алкоголя на морфофункциональное состояние гистаминергических нейронов гипоталамуса крысы через 1 час после 7-го введения этанола в дозе 4 г/кг/сутки. Задачи исследования: установить влияние многократного введения алкоголя на структурные и гистохимические изменения в данных нейронах мозга. Исследование проведено на 40 беспородных белых крысах-самцах. Масса животных составляла 175 ± 25 граммов. В работе использованы: гистологический, гистохимический, цитофотометрический, морфометрический и статистический методы исследования.

Семикратное воздействие этанолом в дозе 4 г/кг/сутки вызывает существенные структурные изменения гистаминергических нейронов гипоталамуса. Так, данные нейроны несколько увеличиваются в размерах и округляются. Наблюдается увеличение размеров и округление перикарионов исследован-