

#### Литература:

1. Катцунг, Б.Г. Нестероидные противовоспалительные средства / Б.Г. Катцунг // Базисная и клиническая фармакология: в 2 т. / Б.Г. Катцунг. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Бинном, Санкт-Петербург: Диалект, 2008. – Т.2. – С. 69–95.

1 Исследование выполнено в рамках ГНТП РБ «Фармацевтические субстанции и лекарственные средства» (подпрограмма «Аминокислоты») по заданию «Разработать цитопротектор и корректор метаболизма эпителиальных тканей «тауцин» и освоить его производство на СП ООО «Фармлэнд» (2011 – 2019 гг.).

## **ОРГАНИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

*Перец К.Л.*

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  
Кафедра психологии и педагогики  
Научный руководитель – С.Л.Бойко

Органические психические расстройства (ОПР) возникают в самых разнообразных клинических ситуациях и осложняют течение многих заболеваний. Установленным считается тот факт, что ОПР чаще встречаются в популяции у лиц мужского пола; это связывают с особенностями их трудовой занятости, социального функционирования. Особое место занимает проблема психических расстройств у пожилых лиц. В Беларуси за последние 10 лет численность людей пожилого возраста увеличилась на 74,8 тыс. человек, или на 4,2%.

Актуальность изучения органических психических расстройств неуклонно растет, что объясняется частотой этих состояний и увеличением продолжительности жизни населения.

Материалы и методы исследования: Объектом явилось население Республики Беларусь, старше 40 лет. За единицу наблюдения принят каждый случай ОПР в течение 2002-2013гг. Проведена оценка интенсивных показателей болезненности и заболеваемости этой группой психических расстройств, определены тенденции распространения данной патологии. По анализу динамики эпидемиологических показателей за 2002-2013гг определены тенденции распространения данной патологии. Исследование выполнено при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований в рамках темы «Оценка медико-социального бремени органических психических расстройств» (договор №М14М-082 от 23 мая 2014 г.).

Результаты исследования: Заболеваемость и болезненность ОПР неоднородна в возрастных группах 40-59 лет, мы наблюдаем снижение этих показателей среди мужчин. Интенсивный показатель болезненности ОПР у мужчин, в возрасте 40-59 лет характеризуется следующим образом: средний показатель болезненности составляет 851,78 на 100 тысяч населения, средний уровень заболеваемости ОПР 596,29 на 100 тысяч населения. Среди женщин 40-59 лет такой тенденции не отмечается, как среди мужчин, так и женщин в возрастной группе лиц старше 60 лет отмечается увеличение распространенности данной патологии. В течение 2002-2013 гг. в Республике Беларусь среди мужчин и женщин старше 60 лет, показатель заболеваемости ОПР неуклонно возрастал, если в 2002г. этот показатель для мужчин составил 296,36 на 100 тыс. населения, то уже в 2013 – 753,50 на 100 тыс. населения,

что на 39% выше, для женщин этот показатель на 2002г. составил 291,52 на 100 тыс. населения, а уже в 2013 - 996,64 на 100 тыс. населения, что на 29% выше.

Вывод: Распространенность ОПР зависит от возраста. Наблюдается стойкое увеличение интенсивных показателей и заболеваемости, и болезненности ОПР у лиц, старше 60 лет. Установленным считается тот факт, что ОПР чаще встречаются в популяции у лиц мужского пола.

Литература.

1. Гаврилова С.И. Психические расстройства при первичных дегенеративных (атрофических) процессах головного мозга // Руководство по психиатрии: в 2-х т. Т.2 / А.С. Тиганов, А.В. Снежневский, Д.Д. Орловская и др. / под ред. А.С. Тиганова. – М.: Медицина, 1999. – С. 57-117.

2. Corey-Bloom J., Thal L., Galasko D. et al. Diagnosis and evaluation of dementia // Neurology. – 1995. – № 45. – P. 211-218.

3. Devanand D.P., Jacobs D.M., Tang M.X. et al. The course of psychopathologic features in mild to moderate Alzheimer disease // Arch. Gen. Psychiatry. – 1997. – № 54. – P. 257-263.

## **ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ**

*Перец К.Л., Пашковец А.В.*

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь  
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  
Научный руководитель: д.м.н., проф. Тищенко Е.М.

Актуальность темы. «Сам себе психолог» - опасный миф, основанный на наивном бытовом представлении о психологии. Профессиональная психотерапевтическая помощь может быть рекомендована как людям, испытывающим локальные, ситуативные психологические трудности, так и тем, кто страдает от симптомов хронического психического расстройства.

Цель: Выявить осведомленность населения о психотерапевтической помощи.

Материалы и методы: Проведен опрос городского населения анкеты, составленной нами и состоящей из 12 вопросов, для оценки влияния стрессовых факторов и осведомленности о психотерапевтической помощи. В исследовании приняли участие 152 пациента среди которых 78 мужчин, 74 женщины, в трех возрастных группах: до 19 лет, 20-39 лет, 40-59 лет.

Результаты: Основная доля анкетированных узнали о психотерапевтической помощи из интернета, каждый третий – из источников массовой информации (телевидение, книги, газеты) Семь из десяти опрошенных (72,5%) никогда не прибегали к психотерапевтической помощи. В то же время одна пятая часть респондентов считает, что сумели помочь себе сами (23,4%). Половина анкетированных (56,4%) нейтрально относится к людям с психическими расстройствами. Три из десяти опрошенных (32,3%) относятся негативно к таким людям. Оставшиеся анкетированные (11,3%) ответили, что бояться их. Половина опрошенных (53,4%) оценивают свое внутреннее состояние как напряженное, каждый третий ощущает внутреннюю скованность (34,7%) и только один из десяти опрошенных ощущает душевный покой и спокойствие (11,9%). Половина респондентов указали, что стрессовым фактором для них является изменение финансового положения (44,6%), для одной чет-