

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ ПАЙРА У ДЕТЕЙ, ВЫБОР ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ

Ковальчук В.И., Ковальчук Т.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Одной из органических причин хронических запоров и абдоминального болевого синдрома у детей является болезнь Пайра, которая является достаточно распространённой патологией пищеварительного тракта [1].

Целью исследования явилось изучение клиники и лечения болезни Пайра у детей.

Материал и методы. В клинике детской хирургии ГрГМУ за период с 2007-2013 гг. на обследовании и лечении находился 31 пациент с болезнью Пайра.

Результаты и их обсуждение. У всех больных клиническая картина проявлялась типичными симптомами: болевой, запоры, снижение аппетита, тошнота и рвота. Ирригографию выполняли в трех положениях: лежа на спине в прямой и боковой проекции и в положении стоя — после опорожнения кишки. В большинстве случаев болезнь Пайра сопровождалась долихоколоном и спастическим колитом. Лечение всех больных начинали с комплекса консервативных мероприятий, включающих диету и механическую очистку кишечника при помощи очистительных клизм и слабительных препаратов, симптоматическую терапию. Показанием для хирургического лечения болезни Пайра являлось: абдоминальный болевой синдром и хронический колостаз, явления вторичного энкопреза, склонность к повторному образованию каловых камней, отсутствие положительного эффекта от консервативного лечения в течение 6 месяцев. Основным методом хирургического лечения болезни Пайра — лапароскопический.

ЛИТЕРАТУРА

1. Куш Н.Л. Болезнь Пайра у детей // Вестник хирургии, 1990- №11. - С 29-32.