

искусственное вскармливание была гипогалактия. Продолжительность исключительно грудного вскармливания составила: до 6 месяцев – 57%, до 1 года – 20%, до 1,5 года – 16%, до 2 лет – 6%, более 2 лет – 1%. При смешанном вскармливании осуществляли докорм смесями. В основном были использованы смеси «Беллакт». 79% смесей было с сывороточным белком, 19% – с казеиновым, 1% пришелся на безмолочную смесь. 59% опрошенных сообщили, что выбрали смесь самостоятельно, а 41% – по совету врача. С первого раза подобрали подходящую смесь 59%, сменили 2-3 смеси – 38%, сменили 4 и более смесей – 3%.

У большинства детей наблюдался хороший аппетит на первом году жизни. При введении первого прикорма, следует отметить, что большая часть ввела прикорм в сроки, рекомендуемые ВОЗ – 4-6 месяцев (88%). Однако, были случаи, когда первый прикорм был введен в 3 месяца (7%) и даже в 2 месяца (2%). 41% опрошенных ввели первым прикормом фруктовые соки и пюре, 35% – овощное пюре и 24% – каши. 62% прикормов имели промышленное производство и 38% домашнее.

Динамика массо-ростовых показателей удовлетворительная. 60% детей по физическому развитию находятся в пределах 25-75 центилей. Однако, следует отметить, что 31% детей выходит за пределы 75 центилей, что характерно для детей, находящихся на искусственном вскармливании. Заболеваемость детей не зависела от вида вскармливания: у 79% детей матери отмечали различные рода заболевания (чаще всего отмечались ОРВИ – 81%), 21% не болели.

Выводы. На современном этапе низким остается процент естественного вскармливания. При выборе смеси недостаточен авторитет участкового врача, так как решение о выборе смеси больше половины родителей приняли самостоятельно.

ИСХОДЫ РОДОВ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА ПРИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Шейко С.В., Кукса В.А.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра акушерства и гинекологии

Научный руководитель – к.м.н., доцент Егорова Т.Ю.

Цель исследования: изучение течения беременности и родов у женщин с патологической кровопотерей.

Задачи исследования: оценить объем кровотечений, тактику при остановке кровотечений.

Материалы и методы. Изучение течения беременностей и родов у 55 пациенток за 2012 год, у которых была зафиксирована патологическая кровопотеря. Возраст пациенток от 19 до 45 лет, максимально преобладают роженицы в возрасте 26-35 лет, что составляет 49%, а 14,5% - это женщины в возрасте старше 40 лет. Из перенесенных гинекологических заболеваний преобладает эрозия шейки матки, выявленная у 20 пациенток, что составляет 36,6%, а также миома матки, обнаруженная у 6 пациенток, что составляет 10,9%. Из гинекологического анамнеза у пациенток было 18 прерываний беременности по собственному желанию (32,7%). Течение настоящей беременности протекало с угрозой прерывания однократно у 21 женщины (38,2%), а двукратно, трехкратно и четырехкратно у 6 женщин. Исходная анемия во время беременности легкой и средней степени тяжести была выявлена у 36,6% пациенток. Антианемическую терапию получало 23,6% женщин. 17 женщин (30,9%) было первобеременных и первородящих. Все пациентки были родоразрешены оперативным путем. Показанием для оперативного родоразрешения у 20% рожениц была преждевременная отслойка нормаль-

но расположенной плаценты. В 12,7% случаев показанием было наличие рубца на матке. Преждевременные роды были у 14 пациенток (25,5%). Миомэктомия была произведена у 5 женщин (9,1%), а гистерэктомией закончились 3 случая (5,5%), в связи с кровопотерей больше 1000мл, которая не поддавалась консервативному лечению. Для остановки кровотечений перевязка сосудов производилась в 2 случаях, а в остальных удалось остановить кровотечение консервативным путем. Объем кровопотери в количестве 600 - 800 мл наблюдался у 21 роженицы (38,2%), 800-1000мл - у 31 роженицы (56,4%), а свыше 1000мл - у 3 женщин, что составило 5,5%. Гемотрансфузия во время операций была проведена у 14,5% пациенток. Повторное кесарево сечение имело место у 12,7% женщин с кровопотерей 600-800 мл. Родилось 60 детей, из них 5 двоен. Оценка по шкале Апгар основной массы детей были 8/8 и 8/9 баллов, что составляет 88,3%, а 7 детей (11,7%) были переведены на ИВЛ. 30% новорожденных имели вес меньше 2,5 кг, 65% имели вес от 2,5 кг до 4,0 кг, а 5% родились с весом выше 4,0 кг. Из новорожденных у 6,7% выявилась врожденная пневмония, у 12,7% - гипоксия, у 6,7% - выраженная дыхательная недостаточность, а у 8,3% - РДС.

Выводы:

1. Из обследуемых пациенток каждая 6-я была старше 40 лет.
2. Досрочное родоразрешение при преждевременных родах у беременных имело место у каждой 4-й пациентки.
3. Патологическая кровопотеря от 1000 мл до 1200 мл была у 3 пациенток, в связи с выраженной гипотонией матки, что не поддавалось консервативному лечению, поэтому потребовалась гистерэктомия.
4. Исходная анемия у каждой 3 пациентки потребовала выполнения гемотрансфузии у 14,5% женщин.

Литература:

1. Акушерство: Учебник / Г.М.Савельева [и др.]. – М.: Медицина, 2011. – 651 с.
2. Бодяжина, В.И. Акушерство: учебное пособие / В.И. Бодяжина, И.Б. Семенченко. – Изд. 5-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 477 с.

ТЕХНОЛОГИЯ МАНИПУЛЯЦИЙ МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ

Шенец Н.В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра социально-гуманитарных наук

Научный руководитель – канд. ист. наук, проф. Лукьянова Л.И.

Актуальность. Вопрос о манипуляции общественным сознанием активно поднимается в отечественных и зарубежных произведениях, ведь система манипулирования может привести к возникновению искаженного видения мира, что является угрозой для общества и мира в целом.

Цели и задачи: осмыслить специфику понятия «манипуляция», проанализировать механизм реализации манипуляции в обществе, обосновать связь манипуляции и власти.

Под массовым сознанием понимают термин, который используется для обозначения шаблонного сознания граждан, формирующегося под действием средств массовой информации и стереотипов массовой культуры. Одной из составляющих массового сознания является массовое поведение. Под массовым поведением обозначают различные формы поведения большинства групп людей, толпы и прочих массовых явлений. К манипуляции массовым сознанием, а как следствие, и массовым поведением относят рекламу, национализм, феминизм, политические действия, компьютеризация, мода.

Что же представляет собой манипуляция? Манипуляция – это воздействие на сознание, психику, эмоции человека с целью изменения и управления цен-