

Выводы. Корреляция данных количественной ультразвуковой диагностики стеатоза с биопсией на стадии S0 соответствует $r=0,84$; на стадии S1 $r=0,71$, S2 $r=0,73$, на стадии S3 соответствует $r=0,85$, что свидетельствует о высокой информативности данного метода.

Литература

1. Балукова Е. В., Барышникова Н.В., Белоусова Л.Н. Неалкогольная жировая болезнь печени: современное состояние проблемы // Фарматека. 2016; 2: 63-8. [Balukova EV, Baryshnikova NV, Belousova L.N. Non-alcoholic fatty liver disease: current state of the problem // Farmateka. 2016; 2: 63-8. (In Russ)].
2. European Association for the Study of the Liver (EASL); European Association for the Study of Diabetes (EASD); European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. J. Hepatol. 2016; 64(6): 1388-402. DOI: 10.1016/j.jhep.2015.11.004.
3. Борсуков А. В., Венидиктова Д. Ю. Ультразвуковая диагностика стеатоза печени: разработка новой методики количественной оценки патологического процесса // Медицинский алфавит. 2017. 19. С. 47-51. [Borsukov AV, Venidiktova DYU. Ultrasound diagnosis of liver steatosis: the development of a new method for the quantitative assessment of the pathological process // Medical alphabet. 2017.19., pp. 47-51. (In Russ)].

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТЕПЕНИ ДЕПРЕССИВНОСТИ С УРОВНЕМ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Веремская А. В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра психологии и педагогики

Научный руководитель – преподаватель Кевляк-Домбровская Л. Э.

Актуальность. Распространенность депрессивных состояний среди населения планеты достаточно высока: по данным ВОЗ она составляет около 5%. Кроме того, наряду с увеличением распространенности депрессий, в настоящее время отмечается рост агрессивного и аутоагрессивного поведения. Однако, несмотря на существование многочисленных исследований представленных свойств личности, вопрос о взаимосвязи депрессивного состояния и проявления агрессивности остаётся открытым и сохраняет свою актуальность как в теоретической, так и практической сферах.

Цель. Изучение степени депрессивности и уровня агрессивности в экспериментальной выборке, а также обнаружение взаимосвязи депрессивного состояния с проявлением агрессивности у студентов Гродненского государственного медицинского университета.

Материалы и методы исследования. Психологическое тестирование при помощи методики дифференциальной диагностики депрессивных

состояний Зунге в адаптации Т. И. Балашовой [1, с. 82] и методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки в адаптации А. К. Осницкого [1, с. 174]. Проведена статистическая обработка результатов исследования (U-критерий Манна-Уитни). Эмпирическую базу составили 42 студента 3 курса лечебного и медико-психологического факультетов ГрГМУ.

Результаты. Сопоставление результатов тестирования испытуемых с различным уровнем депрессии и агрессивности с использованием U-критерия Манна-Уитни продемонстрировало следующие результаты: агрессивность при состоянии без депрессии – агрессивность с легкой депрессией ($U(p \leq 0.01) = 70$, $U(p \leq 0.05) = 89$, $U = 64$), агрессивность с легкой депрессией – агрессивность с умеренно-выраженной депрессией ($U(p \leq 0.01) = 20$, $U(p \leq 0.05) = 28$, $U = 46$).

Выводы. В результате проведенного исследования и анализа его результатов с применением статистической обработки взаимосвязь между уровнем депрессии и агрессивностью не была обнаружена. В экспериментальной выборке с увеличением степени депрессивности не происходит роста уровня агрессивности.

Литература

1. Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д. Я. Райгородский // Самара: Бахрах-М, 2011. – 672 с.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОНОГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА В ДИАГНОСТИКЕ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ

Верховодко А. И.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра акушерства и гинекологии

ООО «Клиника женского здоровья»

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Кажина М. В.

Актуальность. Соногистероскопия (СГС) – методика, позволяющая в режиме реального времени не только проверить проходимость маточных труб (ПМТ), но и оценить состояние полости матки и зафиксировать все обнаруженные изменения на снимках и электронных носителях.

Цель. Оценка преимуществ СГС как метода диагностики ПМТ, патологии полости матки.

Материалы и методы исследования. Выборочное ретроспективное исследование архивных данных пациентов ООО «Клиника женского здоровья» ($n = 50$). Основной диагноз: «N.97 Женское бесплодие». Медиана наблюдения – 3 года.

Результаты. Средний возраст пациентов – 33 года. У 2/3 (73,8%) гинекологический анамнез отягощён. ПМТ была выявлена в 85,3% случаев,