

одной маточной трубы – в 10,5%. В 4,2 % маточные трубы были непроходимы. В 46 случаях (92%) проведённых СГС выявлена патология полости матки: 46,7% – полип эндометрия, 32,4% – полип/синехии?, 20,9% – синехии. В 8% исследований патологии полости матки и маточных труб выявлено не было. В 34 случаях диагностические находки явились показаниями для выполнения диагностической гистероскопии, гистерорезектоскопии со взятием биопсийного материала эндометрия, гистерорезектоскопической полипэктомии, гистерорезектоскопического разъединения синехий полости матки. Гистологическое подтверждение СГС диагноза получено в 65,7% случаев. В 20,1% случаев была выявлена иная, ранее не диагностированная патология (субмукозная миома матки небольших размеров, двурогая матка, неполная перегородка полости матки, аденомиоз). В 14,2% оперативных вмешательств не было выявлено патологии полости матки.

Выводы. СГС – оптимальный диагностический метод, симультанно выявляющий патологию полости матки и ПМТ. Жидкостная визуализация полости матки повышает эффективность изолированной сонографической диагностики в 3 раза. Метод безопасен с точки зрения аллергических реакций.

Литература

1. Биссет Р. Ультразвуковая дифференциальная диагностика в акушерстве и гинекологии / РЭЛ Биссет, Дурр-э-Сиха, Найджел Б. Томас, Али Наваз Хан//Москва: «МЕДпресс-информ», 2018. – 344с.

АНТИМЮЛЛЕРОВ ГОРМОН КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖЕНСКОЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ

Верховодко А. И.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра акушерства и гинекологии

ООО «Клиника женского здоровья»

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Кажина М. В.

Актуальность. Снижение показателя общей фертильности в развитых странах мира определяет актуальность проблемы с точки зрения доказательной диагностики и выбора оптимальной тактики лечения бесплодия. Одним из важнейших показателей женской фертильности является овариальный резерв, уровень которого определяется показателем антимюллерового (АМГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов. Клиническая значимость АМГ заключается не только в оценке овариального резерва, но и в дополнительной диагностике синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), прогнозе эффективности стимуляции овуляции и синдрома гиперстимуляции яичников в циклах ЭКО, диагностике гранулёзоклеточных опухолей яичников,

мониторинге сохранности овариальных возможностей после операций на яичниках и др.

Цель. Изучение уровня АМГ у женщин репродуктивного возраста как одного из факторов, определяющих состояние фертильности.

Материалы и методы исследования. Выборочное ретроспективное исследование архивных данных пациентов ООО «Клиника женского здоровья» (n = 108). Основной диагноз: «N.97 Женское бесплодие». Медиана наблюдения составила 3 года.

Результаты. Уровень АМГ у 35,1% исследуемых находился в пределах 2,5-8 нг/мл, у 26,9% – 1-2,5 нг/мл. У 21,3% пациентов показатель АМГ был менее 1 нг/мл, что может говорить о низком овариальном резерве. Значения выше 8 нг/мл были зарегистрированы у 16,7% человек, что в свою очередь может служить одним из диагностических критериев при постановке диагноза СПКЯ. Сонографическая картина характеризовалась признаками ановуляции, объемы яичников превышали 10 см³. 15 пациенткам из этой группы была выполнена лапароскопия, диагноз СПКЯ был подтвержден во всех случаях. При этом у 46,7% этой группы уровень АМГ был более 10 нг/мл. Дополнительно были исследованы показатели уровня ФСГ в ранней фолликулиновой фазе цикла. В 90,7% случаев значения ФСГ колебались от 3,5 до 12,5 мМЕ/мл, а в 9,3% – >10 мМЕ/мл.

Выводы. Исследование АМГ позволяет в полной мере оценить овариальный резерв женщины. При подозрении на СПКЯ является одним из достоверных показателей, позволяющим оптимизировать тактику лечения.

Литература

1. Подзолкова, Н.М. Невынашивание беременности / Н. М. Подзолкова, М. Ю. Скворцова, Т. В. Шевелёва. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 134 с.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНЩИН С УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ В БРАКЕ

Викторович Ю. И.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Кафедра психологии и педагогики

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Воронко Е. В.

Актуальность. Проблема удовлетворенностью браком является важной и по сегодняшний день, так как имеет значение в отношении многих сфер жизни. Степень удовлетворенности браком может привести к распаду семьи или, напротив, укрепить супружеские отношения.

Цель. Изучение взаимосвязи удовлетворенности браком и личностных особенностей у замужних женщин.