

Эмпирическую базу составила выборка из 200 руководителей системы здравоохранения мужского и женского пола от 26 лет до 71 года.

Результаты. В ходе эмпирического исследования были выявлены следующие результаты: процент высокого и очень высокого уровня коммуникативных способностей у женщин – 57%, у мужчин – 62%. Высокий и очень высокий уровень организаторских способностей определён у 74% испытуемых как мужского, так и женского пола.

Выводы. Общий уровень развития коммуникативных и организаторских способностей у руководителей в Республике Беларусь находится на высоком и выше среднего уровнях. Это обусловлено улучшением качества подготовки и повышением квалификации специалистов, занимающих руководящие должности. Гипотеза о существовании связи и влиянии половых различий на выраженную коммуникативные и организаторские способности была опровергнута.

Литература

1. Михайлов, Л. А. Психология общения: учеб. пособие / Л. А. Михайлов, В. П. Соломин. – СПб. : Образование, 1994. – 103 с.
2. Уманский, Л. И. Психология организаторских способностей: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Л. И. Уманский. – Курск, 1968. – 30 с.

ЧАСТОТА НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Жернак Т. О., Плеско С. В.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра нормальной физиологии

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Королёв П. М.

Актуальность данного исследования подтверждается довольно высокой частотой невротических расстройств (более 35%) среди студентов вузов [1, 2]. Следует подчеркнуть, что состояние здоровья студенческой молодежи – важнейший показатель благополучия государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее.

Цель – изучить частоту невротических расстройств у студентов-медиков в начале учебного года.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 30 студентов 2 курса Гродненского государственного медицинского университета. Диагностика невротических расстройств осуществлялась с использованием клинического опросника К.К. Яхина и Д.М. Менделевича [2] в режиме онлайн (<https://www.psychol-ok.ru/statistics/kodvions/>).

Результаты. По результатам теста были получены следующие значения: стабильная психическая адаптация – 57%, нестабильная психическая адаптация – 23 %, невротические расстройства – 20 %.

В структуре различных невротических расстройств выявлены следующие показатели: тревожность – 20%, невротическая депрессия – 23%, астения – 20%, истерический тип реагирования – 13%, обсессивно-фобические расстройства – 37%, вегетативные нарушения – 7%.

Выводы. Полученные результаты согласуются с данными литературы [1, 2] и подтверждают наличие достаточно высокого уровня невротических расстройств у студентов-медиков в начале учебного года, обусловленных психогенным воздействием специфических условий обучения и развитием информационного стресса, что требует тщательного подхода медико-социальных и психологических служб к их выявлению, лечению и профилактике.

Литература

- Сахаров, А. В. Частота и структура невротических расстройств у студентов разных типов учебных заведений Забайкальского края / А. В. Сахаров, О. А. Тимкина, Н. В. Говорин // Забайкальский медицинский вестник. – 2018. – № 3. – С. 56-62.
- Матвеев, А. В. Социально-психологические особенности развития и профилактики невротических расстройств у студентов вузов в процессе учебной деятельности / А. В. Матвеев // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2011. – Вып.7. – С. 57-63.

ОЦЕНКА СООТНОШЕНИЯ ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНО- И КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЕГО ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Жигимонт А. В., Здрок В. С.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Научный руководитель – ассистент Зарецкая Е. С.

Актуальность. Заболеваемость раком предстательной железы в Республике Беларусь в настоящее время занимает первое место по темпам прироста среди всех злокачественных новообразований.

Цель – выявить наличие корреляции между степенью дифференцировки опухоли и вероятностью возникновения рецидива при различных вариантах терапии.

Материалы и методы исследования. Проанализированы архивные данные УЗ «Гродненская университетская клиника» за 2019 г. Группу исследования составили 64 пациента с морфологически верифицированным РПЖ старше 40 лет.