

кровотечения. В анамнезе у обоих пациентов портальная гипертензия, возникшая на фоне декомпенсированного цирроза печени. Ранее больные были оперированы по поводу тромбоза мезентериальных сосудов с наложением энтеро-энтеро анастомоза по типу бок в бок. Впоследствии у каждого из больных сформировались гигантские послеоперационные вентральные грыжи.

**Результаты.** С целью диагностики использовались доступные методы – колоноскопия, фиброгастроудоденоскопия, не выявившие источник кровотечения. На фоне рецидива кровотечения было принято решение о проведении лапаротомии. Интраоперационно у обоих пациентов обнаружен распространенный спаечный процесс. После проведенного висцеролиза выявлен источник кровотечения в месте энтеро-энтеро анастомоза, где сформировалась язва с эрозированным сосудом в центре. Была проведена резекция участка кишки, несущего анастомоз с язвой с формированием нового энтеро-энтеро анастомоза бок в бок.

**Выводы.** Язва, сформированная в области энтеро-энтеро анастомоза, является редким, но возможным источником кровотечения. Доступные методы диагностики не всегда эффективны в поиске источника тонкокишечного кровотечения. В данных и других случаях недиагностируемых тонкокишечных кровотечений лапаротомия является методом выбора.

#### Литература

1. Katz, L. B. The role of surgery in occult gastrointestinal bleeding / L. B. Katz // *SeminGastrointestDis.* – 1999. – № 10(2). – P. 78–81.

## ЗАВИСИМОСТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СИБЛИНГАМИ ОТ ИХ ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И НАЛИЧИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ

**Обуховский А. В.**

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра медицинской психологии и психотерапии

Научный руководитель – ассистент Жигар А. М.

**Актуальность.** Существует множество исследований, посвящённых особенностям психологического развития и специфике сиблинговых отношений в зависимости от очерёдности рождения. Однако половым различиям, несмотря на их значимость, уделяется мало внимания. Так же актуальным является исследование отношений у сиблингов, имеющих некоторые психологические особенности или заболевания, что может помочь в ранней диагностике отклонений и расширении возможностей по корректированию поведения у детей и подростков.

**Цель.** Изучить психометрические оценки и дифференциации нормативных и дисфункциональных сиблинговых отношений в зависимости от половой принадлежности обоих сиблингов и от наличия или отсутствия психических и поведенческих расстройств. Оценка в рамках характеристики четырёх свойств сиблинговых отношений: эмпатии, поддержания границ, схождения и принуждения.

**Материалы и методы исследования.** Для исследования выбран метод опроса с помощью «братско-сестринского опросника» и проведено интервьюирование 40 респондентов. Детально изучены и проанализированы результаты опроса, а также теоретические данные по выбранной тематике и результаты других исследований.

**Результаты.** Результаты исследований показали противоречивые данные относительно влияния половых отличий во взаимодействии сиблингов. У исследуемой группы с наличием проблем психологического характера выявлены дисгармоничные братско-сестринские отношения.

**Выводы.** По результатам исследования можно сделать вывод о незначительном влиянии гендерных различий на отношения между сиблингами по сравнению с другими факторами, оказывающими влияние на тип формируемого взаимодействия, такими как наличие психологических проблем и отклонений.

#### Литература

1. Klas, N. Literature review: a closer look at ordinal positioning / N. Klas // Marriage and family therapy. – 2002. – Vol. 64. – P. 1–61.

## ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ СЕЛЕЗЁНКИ

**Оганесян А. А., Соболев А. А.**

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  
1-я кафедра хирургии

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Могилевец Э. В.

**Актуальность.** Первичные (истинные) кисты составляют 25% от всех непаразитарных кист. В настоящее время настоятельно рекомендуется малоинвазивный спленосохраняющий подход при лечении данной патологии вследствие важной роли селезёнки в иммунитете и регуляции циркулирующего объёма крови [1]. Лапароскопические технологии, обладая преимуществами малоинвазивного доступа, помогают выполнить объём операции, сопоставимый с открытой хирургией.

**Цель.** Анализ результатов редкого клинического случая выполнения лапароскопической резекции селезёнки у пациентки с большой симптоматической кистой её верхнего полюса.