

Первую возрастную группу (возраст до 40 лет) составили 3 пациента. Все пациенты данной возрастной группы были прооперированы. Исходы лечения: 2 (67%) пациента были переведены в другие ЛПУ для дальнейшего лечения и реабилитации, у 1 (33%) пациента наблюдался летальный исход.

К возрастной группе от 40 до 60 лет были отнесены 27 пациентов. Оперативные вмешательства были проведены в 78% случаев. Вентрикулостомия была выполнена 6 (22%) пациентам, удаление гематомы – 15 (56%), в том числе эндоскопически – в 8 (30%). Исход: выписаны в связи с улучшением состояния – 2 (7%), переведены в другие ЛПУ – 20 (60%), у 5 (19%) пациентов наблюдался летальный исход.

Внутримозговые гематомы в возрастной группе более 60 лет наблюдались у 26 пациентов. Оперативное лечение было проведено в 92%. Доля вентрикулостомий среди операций составила 19% (5 случаев), удаление гематомы – 73% (16), в том числе эндоскопически – 31%. Исход: выписан в связи с улучшением состояния – 4 (15%), переведен в другие ЛПУ для дальнейшего лечения и реабилитации – 16 (62%), летальный исход – 6 (23%).

Выводы. Послеоперационная летальность пациентов составила (25%). В послеоперационном периоде 84% выживших пациентов были переведены в другие ЛПУ для ранней реабилитации, остальные пациенты (16%) выписаны на амбулаторное лечение.

Литература

- Хирургия геморрагического инсульта / В. В. Крылов [и др.] – М.: Медицина, 2012. – 336 с.

АНАЛИЗ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Цырельчук В. Н., Зуева Н. С.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Научный руководитель – ассистент Ногтева А. В.

Актуальность. Экспертиза временной нетрудоспособности является важной функцией здравоохранения. Через заболеваемость с временной утратой нетрудоспособности система здравоохранения существенно влияет на экономику страны [1, с.51].

Цель. Провести сравнительный анализ временной нетрудоспособности и факторов риска у работников белорусской железной дороги.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 126 медицинских карт амбулаторных больных (ф.025/у-07) на базе городской поликлиники №1 города Гродно. Проанализированы медицинские карты сотрудников белорусской железной дороги, работающих в локомотивном депо

и оценена временная нетрудоспособность за период времени с 01.01.2018 по 31.12.2018. Статистическая обработка данных проведена с использованием компьютерной программы STATISTICA 10,0; «Microsoft Office Excel 2016».

Результаты. В нашем исследовании были получены следующие данные: минимальное число дней нетрудоспособности, что составило 2 дня и максимальное – 17 дней. Далее для подробного исследования были рассчитаны показатели: частота случаев нетрудоспособности, составившая 36 случаев заболеваемости на 100 рабочих в год, и число дней нетрудоспособности, составившее 270 дней на 100 рабочих в год. Что касается «индекса здоровья», то его значение было 64,29 %. В связи с тем, что в 2018 году длительно болевших выявлено не было, то удельный вес часто и длительно болевших и часто болевших были равны и составили 0,79%. Структура заболеваемости с временной утратой нетрудоспособности представлена заболеваниями верхних дыхательных путей и составила почти $\frac{1}{2}$ (17 случаев на 100 рабочих в год), заболеваниями периферической нервной системы – $\frac{1}{4}$, остальная $\frac{1}{4}$ случаев представлена другими заболеваниями (в том числе острым отитом).

Выводы. 1. Наиболее частыми причинами выхода на лист временной нетрудоспособности у исследуемых были заболевания верхних дыхательных путей и периферической нервной системы. Это можно связать с вредными факторами, действующими на работников локомотивного депо: тяжесть труда, работа в ночную смену, нахождение в фиксированной позе, работа на высоте. 2. Специфическим для работников данной сферы является поражение органов слуха, что связано с вредными факторами: шум, общая вибрация.

Литература

1. Чеченин, Г. И. Медико-экономическая и социальная эффективность модели экспертизы временной нетрудоспособности / А. И. Беляевский, Н. М. Жилина // Бюллетень со РАМН. – 2007. – №1. – С.51–55.

ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ

Чекавая Е. А., Нестерович В. С.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Научный руководитель – старший преподаватель Трусь Е. И.

Актуальность. Проблема репродуктивной культуры среди молодёжи является актуальной во всём мире. Молодёжь представляет собой репродуктивный потенциал общества, и от уровня здоровья современных юношей и девушек зависит здоровье последующих поколений, устойчивость экономического развития и национальная безопасность государства.