

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ГУ «РНПЦ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»



МАТЕРИАЛЫ III СЪЕЗДА ПСИХИАТРОВ
И НАРКОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПСИХИАТРИЯ
И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО



г. Минск, 3-4 декабря 2009 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
Издания

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛАРУССКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ГУ «РНПЦ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

МАТЕРИАЛЫ III СЪЕЗДА ПСИХИАТРОВ И НАРКОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПСИХИАТРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Председатель редакционного совета –

Игумнов С. А., д. м. н., профессор

Заместитель председателя редакционного совета –

Докукина Т. В., д. м. н.

Члены редакционного совета:

Евсегнеев Р. А., д. м. н., профессор

Скугаревский О. А., д. м. н.

Байкова И. А., к. м. н., доцент

Доморацик В. А., д. м. н., профессор

Айсберг О. Р., к. м. н., доцент

Генеральные спонсоры:

Les Laboratoires Servier,

Janssen-Cilag

Главные спонсоры:

Lundbeck,

Sanofi-Aventis

Спонсоры:

Lilly, Egis, OlainFarm, Pfizer, Sun Pharmaceutical, Grindex

Научное издание

При поддержке

научно-практических журналов
«Психиатрия» и «Психотерапия и
клиническая психология»

Адрес редакции:

220023, Минск, ул. Чернышевского, 10а, оф. 805

Тел.: (017) 280 01 12, (017) 280 88 09

recipe@recipe.by (редакция)

ro@recipe.by (рекламный отдел)

Тираж 299 экз. Заказ № 3267.

Формат 140x205. Печать офсетная.

Отпечатано в типографии

РУП "Минсктиппроект"

лиц. ЛП №02330/0494102 от 11.03.2009 г.

рованность и систематичность, открытые коммуникации, взаимоотношения личности и группы.

Воздержание от поверхностно-активных веществ (далее – ПАВ) является важным, но не единственным показателем успешной реабилитации. Главный показатель – возвращение в социум и возобновление нормальной жизнедеятельности. Реабилитация завершается овладением основными жизненными навыками, бытовыми умениями, способностью к регулярной учебе и труду.

Основу ТС составляют «ветераны» программы, имеющие стаж трезвости 3 года и более и обладающие способностями оказания помощи новичкам (параспециалисты). Врач психотерапевт проводит первичную консультацию и назначает новичку наставника из числа параспециалистов. В идеале формируется недельный или месячный план помощи, в который обычно входит посещение терапевтической группы, индивидуальные встречи с наставником, индивидуальная работа по терапевтическому модулю, чтение специальной литературы, знакомство с работой групп анонимных алкоголиков (далее – АА), другие необходимые мероприятия, определяемые в индивидуальном порядке. Новичок имеет возможность регулярно встречаться с психологом и врачом и участвовать в различных рекреационных мероприятиях, организуемых ТС. Наставник следит за выполнением плана и оказывает новичку необходимую помощь.

ТС «Ковчег» сотрудничает с Движением АА в Беларуси и за ее пределами, оказывая благотворное влияние даже на тех больных, которые не являются членами терапевтического сообщества.

За 9 лет существования ТС на некоммерческой основе была оказана помощь более 200 человек.

В указанной модели привлекает ее доступность для населения, низкая стоимость, возможность организации в любом населенном пункте, в отдалении от крупных медицинских центров.

Игумнов С. А., Станько Э. П.

ГУ «РНПЦ психического здоровья», Минск,

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно

Потребители инъекционных наркотиков, ВИЧ-инфекция и противоправная активность: анализ данных и поиск зависимостей

Наркотическая зависимость представляет собой сложную медико-социальную проблему, обусловленную не только рядом психических и соматоневрологических расстройств, но и тяжелыми, отдаленными социальными последствиями, которые

часто превышают непосредственный эффект употребления наркотиков, изменяют качество жизни и социальное функционирование потребителя.

В эпидемиологии наркологических заболеваний наибольшую информационную значимость, с учетом требований Европейского центра мониторинга за наркотиками и наркопотреблением (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), имеют пять основных показателей: распространенность потребления наркотиков среди населения, проблемное употребление наркотиков, смертность вследствие потребления наркотических средств, потребность в лечении и инфекционные заболевания у наркотерапевтов [Commission on Narcotic Drugs, 2000]. Вышеуказанные медико-социальные показатели (заболеваемость, болезненность, смертность и др.) позволяют судить об остроте проблемы, создаваемой данной патологией для отдельного региона и государства в целом.

В настоящей работе предполагается рассмотреть основные эпидемиологические аспекты потребления наркотиков и распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), также особенности противоправной активности ПИН. В качестве базовых критериев в данном случае предлагается использовать медико-социальные проблемы, возникающие при их употреблении (заболеваемость, болезненность, смертность). Косвенными критериями наркологической ситуации, представляющими социальную значимость проблемы, являются показатели ВИЧ-инфицированности среди ПИН и характеристика их противоправной активности.

Источниками информации являются статистические материалы наркологической службы Министерства здравоохранения (МЗ), Министерства внутренних дел (МВД) Республики Беларусь (РБ), ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья», ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», Центра мониторинга за наркотиками и наркопотреблением УО «Гродненский государственный медицинский университет», УЗ «Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология».

Проведенное исследование позволяет выявить ряд медико-социальных и поведенческих факторов, связанных с употреблением нелегальных ПАВ, установить их влияние на распространение ВИЧ-инфекции среди ПИН и особенности их противоправной активности.

Вовлечение в наркотизацию людей молодого, наиболее дееспособного возраста, и в связи с этим, отсутствие и/или низкий у многих из них уровень образования; отсутствие трудовой занятости; присоединение коморбидной патологии (ВИЧ-инфекция) обуславливают высокую социальную значимость данной проблемы.