

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

*Лелевич В.В., Винуцкая А.Г., Лелевич С.В., Разводовский Ю.Е.,
Черникевич Е.Ч.*

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Республика Беларусь

По принятым эпидемиологическим модулям, оценка наркологической ситуации в стране осуществляется с учетом данных официальной государственной статистики министерств и ведомств, имеющих дело с наркотиками и наркопотребителями. В Беларуси распространенность злоупотребления наркотическими и токсикоманическими психоактивными веществами (ПАВ) среди населения оценивается параллельно наркологической службой Министерства здравоохранения и Министерством внутренних дел Республики Беларусь.

В Центре мониторинга за наркотиками и наркопотреблением ГрГМУ с 1992 года существует республиканская компьютерная база данных наркопотребителей, регистрируемых на наркологическом учете МЗ РБ. Информация на регистрируемых и снимаемых с учета потребителей наркотиков поступает ежеквартально на адрес центра и вносится в республиканскую компьютерную базу данных. Настоящая база данных является наиболее полным источником эпидемиологической информации на потребителей наркотиков, попадающих в поле зрения наркологической службы Беларуси, что позволяет проводить постоянный мониторинг наркологической ситуации, как во всей республике, так и в отдельных ее регионах.

Целью данного исследования явилось изучение особенностей распространенности потребления наркотических и токсикоманических ПАВ в различных регионах Беларуси.

Объектом исследования явились пациенты с синдромом зависимости от ПАВ (МКБ-10: F 11.2–F.16.2, F18.2–F 19.2) и лица, с пагубным их употреблением (МКБ-10: F 11.1–F.16.1, F 18.1–F 19.1), состоящие на учете территориальных наркологических учреждений в 2007–2010 гг. За единицу наблюдения был принят каждый учтенный потребитель наркотических и токсикоманических веществ, все случаи заболевания синдромом зависимости от наркотических и токсикоманических веществ, зарегистрированные в наркологических учреждениях республики за последние пять лет. Анализ информации на потребителей ПАВ проводился по социально-эпидемиологическим и медицинским параметрам, которые рассчитывались из регистрационных карт наркопотребителей, впервые выявленных и снятых с учета в наркологических учреждениях республики. Данные из регистрационных карт вводились в компьютерную базу данных и подвергались статистической обработке.

Для оценки годовой динамики выявления наркопотребителей в республике и регионах был использован показатель «Распространенность потребления ПАВ», или суммарное количество наркопотребителей, состоящих на наркологическом учете на конец года в расчете на 100.000 населения республики, или отдельного региона.

По данным Центра мониторинга за наркотиками и наркопотреблением на начало 2011 г. на наркологическом учете МЗ РБ состояло 12347 человек, что составило 130,3 человек в расчете на 100 тыс. населения. Для сравнения в начале 2007 г. суммарное количество состоящих на учете потребителей ПАВ составляло 10265 человек, или 105,7 человек на 100 тыс. населения республики.

По итогам 2010 г. наибольшие число потребителей ПАВ в расчете на 100.000 населения состояло на учете в наркологических учреждениях г. Минска (207,4), Гомельской (150,2) и Гродненской (124,0) областях. Меньше всего потребителей ПАВ на 100.000 населения состояло на учете в Витебской (115,6), Минской (88,6) и Могилевской (60,9) областях.

Анализ динамики региональных показателей «Распространенности» за последние пять лет показал неоднородное распределение учтенных наркопотребителей по регионам Беларуси. В большинстве регионов республики расчетное количество зарегистрированных наркопотребителей на 100.000 населения региона превышало среднереспубликанский уровень, за исключением Минской и Могилевской областей. Так, в 2007–2008 г. лидирующее положение по распространенности занимала Гомельская область, где показатель «Распространенности» значительно превысил среднереспубликанский уровень. В последующие годы самые высокие показатели «Распространенности» были отмечены в г. Минске, Гомельской и Брестской областях.

Исследование выявило определенную региональную специфику в распространении отдельных видов ПАВ. В целом, среди учтенных потребителей ПАВ преобладало употребление опийных наркотиков. Однако в наибольшей степени этими наркотиками злоупотребляли в Минской области (80,6%), г. Минске (74,3%) и Брестской области (68,7%). В Витебской области доля учтенных потребителей опийных наркотиков составила всего 48% от всего контингента.

В отношении отдельных видов опиатов и опиоидов также наблюдались определенные региональные различия. Так, употребление экстракционного опия преобладало в Гродненской, Брестской и Могилевской областях. Большинство героиновых наркоманов состояли на учете в г. Минске, Витебской и Минской областях. Та же тенденция была отмечена в отношении лиц, злоупотребляющих легальными опиоидами – морфином и кодеином. Большинство потребителей метадона проживали в г. Минске (50,5%), Витебской (20,1%) и Могилевской (16,6%) областях. Последний факт является косвенным подтверждением информации правоохранительных органов Беларуси о преимущественном поступлении метадона из северо-западных районов Российской Федерации. На начало 2011 г. меньше

всего потребителей метадона было зарегистрировано в Гродненской и Брестской областях.

С 2009 г. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь список 3 опасных психотропных веществ Республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, был дополнен веществами опийной природы — декстрометорфаном и трамадолом. На начало 2011 г. на наркологическом учете МЗ РБ состояло всего 96 потребителей трамадола, из которых 83 проживали в г. Минске.

Вторыми по распространению ПАВ в Беларуси являлись ингалянты. Употребление ингалянтов в наибольшей степени было распространено в Витебской (22,0%), Гродненской (15,0%) и Могилевской (14,2%) областях. В г. Минске потребители ингалянтов составили всего 3,7% от всех состоящих на учете на начало 2011 г.

Третьими по распространению в Беларуси явились каннабиноиды. Наибольшая степень выявления курильщиков каннабиноидов была отмечена в Гомельской (26,1%), Витебской (21,4%) и Брестской (20,1%) областях. В г. Минске 10,6% всех состоящих на учете в начале 2011 г. употребляли каннабиноиды. Меньше всего потребителей этих наркотиков было зарегистрировано в Минской области – 4,3% от всех состоящих на учете.

Для столицы было также характерно интенсивное выявление потребителей психостимуляторов амфетаминового типа, эфедрона и некоторых других ПАВ. В г. Минске проживало 60% из всех зарегистрированных в Беларуси потребителей психостимуляторов.

Больше всего потребителей галлюциногенных ПАВ (растительные атропиноподобные вещества, димедрол, циклодол, тарен и др.) было зарегистрировано в Гомельской и Могилевской областях, где их доли в общем контингенте состоящих на учете составили 2,5% и 2,4%, соответственно. Больше всего потребителей седативных и снотворных средств состояли на учете в Могилевской области.

Таким образом, анализ наркологической ситуации в Республике Беларусь, показал неоднородность распространенности потребления ПАВ по отдельным регионам Беларуси. Наибольшие показатели распространенности потребления ПАВ отмечены в г. Минске и Гомельской области. Во всех регионах республики преобладает выявление потребителей наркотиков опийной группы. Вместе с тем в последние годы увеличилось выявление лиц, потребляющих синтетические опиоиды (метадон, трамал), и экстракционный опий, изготовленный из семян пищевого мака.