

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Припутневич И.П.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра психиатрии и наркологии

Научный руководитель – к.м.н., доцент Станько Э.П.

Актуальность настоящего исследования определяется недостаточной изученностью индивидуально-психологических особенностей лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью и необходимостью индивидуализации форм оказания медико-психологической и реабилитационной помощи.

Цель: изучение личностных особенностей наркологических больных для повышения эффективности проведения клиент-центрированных лечебно-реабилитационных мероприятий.

Задачи: изучить преморбидные особенности больных с алкогольной и наркотической зависимостью; выявить личностные особенности больных с алкогольной и наркотической зависимостью; определить влияние преморбидных особенностей на формирование личностных изменений больных.

Методы исследования: клинико-психопатологический, экспериментально-психологический, клинико-статистический. Для клинического интервьюирования и обеспечения стандартизации исследования использовалась регистрационная карта обследования больных с зависимостью, разработанная на кафедре психиатрии и наркологии УО «ГрГМУ». Для объективизации и уточнения личностных особенностей больных применялось экспериментально-психологическое исследование с использованием опросников Г. Шмишека, FPI, 16PF и тест А.С. Будаси.

Результаты работы. Установлено, что психопатологически отягощенную наследственность имели 90% больных с алкогольной и 35% больных с наркотической зависимостью. Воспитание в неполной семье, неблагоприятные условия проживания, воспитание по типу гипопротекции отмечены у 90% больных с алкогольной зависимостью и у 60% с наркотической зависимостью. В преморбиде у больных с алкогольной зависимостью чаще наблюдались: паранояльный (85%), эмотивный (75%), гипертимный, неустойчивый (65%), педантичный, циклотимный (60%) типы акцентуаций характера, у больных с наркотической зависимостью – неустойчивый (90%), паранояльный, циклотимный (75%), возбудимый (70%), гипертимный и педантичный (60%). У больных с алкогольной зависимостью доминировали эмоциональная лабильность (85%), раздражительность (75%), рассудительность, практичность, прямолинейность, депрессивность, застенчивость (65%), невротичность (60%), подчиненность, безответственность и робость (55%). У больных с наркотической зависимостью преобладающими были невротичность (80%), эмоциональная лабильность (75%), депрессивность (70%), безответственность, агрессивность, раздражительность (60%) и прямолинейность (55%).

Выводы. Проведенное исследование подтверждает необходимость разработки новых методов лечения химической зависимости, а также рекомендаций по стратегии и тактике проведения психокоррекционных мероприятий с учетом личностных особенностей больных. Углубленное понимание закономерностей участия личности в формировании алкогольной и наркотической зависимости и ее инволюции открывает перспективу для поиска стиля психотерапевтического воздействия и методов психокоррекции, определяемых типологическими и индивидуальными особенностями пациентов.

Литература:

1. Bleuler E. Руководство по психиатрии. -Берлин, 1920.-542с.
2. Пятницкая И.Н. Злоупотребление алкоголем и начальная стадия алкоголизма.-Москва-Медицина,1988.-285с.