

$p = 0,001$), тщеславием ($r = 0,37$; $p = 0,003$). Проявления самодостаточности взаимосвязаны с: превосходством ($r = 0,51$; $p = 0,001$), авторитетом ($r = 0,49$; $p = 0,005$), демонстративностью ($r = 0,34$; $p = 0,008$), использованием людей ($r = 0,51$; $p = 0,001$), тщеславием ($r = 0,54$; $p = 0,001$). Проявления превосходства взаимосвязаны с: демонстративностью ($r = 0,33$; $p = 0,009$), использованием людей ($r = 0,32$; $p = 0,012$), тщеславием ($r = 0,52$; $p = 0,001$). Проявления тщеславия взаимосвязаны с демонстративностью ($r = 0,52$; $p = 0,001$) и использованием людей ($r = 0,36$; $p = 0,005$).

Выводы. Преобладающей нарциссической чертой у студентов является авторитет. Наиболее связанными между собой нарциссическими чертами выступают самодостаточность, превосходство, тщеславие, авторитет.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мак-Вильямс, Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе / Нэнси Мак-Вильямс. – М. : Класс, 2016. – С. 102–114.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ-ОТЧУЖДЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕСС УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Козелько А. В.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: магистр психол. наук Кевляк-Домбровская Л. Э.

Актуальность. Отчужденность в процесс учебной деятельности является распространенной проблемой среди обучающихся, что может стать серьезной преградой в обучении и достижении положительных результатов. Степень отчужденности зависит от различных социальных, психологических, биологических факторов.

Цель. Изучение проблемы отчуждения студентов в обучении, а также установление степени, уровня вовлеченности-отчужденности студентов ГрГМУ в процесс учебной деятельности.

Методы исследования. Метод исследования – опрос. Для изучения степени отчужденности был использован тест-опросник «Субъективное отчуждение учебного труда» В.Н. Косырева. Эмпирическую базу составили студенты ГрГМУ 2, 3, 4 курсов лечебного, педиатрического и медико-психологического факультетов.

Результаты и их обсуждение. По результатам эмпирического исследования были получены следующие показатели по шкалам опросника: общий показатель отчужденности – 138,9, по сферам отчуждения шкала учения – низкий уровень, шкала университетской жизни – средний уровень, шкала межличностных отношений – низкий уровень, шкал самооотношения – низкий

уровень отчуждения. Среди форм отчуждения показатели по шкалам составили: шкала вегетативности – низкий уровень, шкала бессилия – низкий уровень, шкала нигилизма – средний уровень, шкала авантюризма – низкий уровень отчужденности.

Выводы. По результатам эмпирического исследования было установлено преобладание относительного уровня отчуждения среди испытуемых. Самые высокие показатели отчужденности студентов проявляются в сферах университетской жизни и самоотношения, в то время как в сферах учения и межличностных отношений результаты низкие. Средняя степень отчужденности в форме нигилизма является наиболее распространенной, а в форме бессилия – наименее выраженной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Косырев, В. Н. Отчуждение учебного труда студента – актуальная проблема высшего образования [Электронный ресурс] / В.Н. Косырев // Вестник ТГУ. – 2008. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/test-oprosnik-subektivnoe-otchuzhdenie-uchebnogo-truda/viewer>. – Дата доступа: 12.10.2020.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ГОМОЦИСТЕИНА НА РАЗВИТИЕ ТРОМБОЗА В ЗОНЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Козлова В. В.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Панасюк О. В.

Актуальность. Наиболее распространенным видом хирургического лечения при поражении бедренно-подколенно-берцового сегмента у пациентов с хронической артериальной недостаточностью (ХАН) является шунтирование. Высокий уровень гомоцистеина (Нсу) увеличивает активность факторов свертываемости крови и ингибирует активацию факторов фибринолиза, что повышает риск развития и прогрессирования тромбозов [1].

Цель. Оценить уровень Нсу у пациентов с ХАН после шунтирующих вмешательств на артериях нижней конечности и определить корреляцию данных показателей с частотой развития тромбозов шунтов.

Методы исследования. В исследование включены 60 пациентов с ХАН, которые перенесли шунтирующие реконструктивно-восстановительные вмешательства на магистральных артериях ниже паховой связки. Возраст пациентов составил $62,3 \pm 7,6$ лет. Уровень Нсу определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии из плазмы крови пациентов,