

сказывается и на потомстве – они могут вызывать различные генетические изменения в клетках живых организмов, в том числе и человека [1].

Цель. Изучение осведомленности современной молодежи о радиоактивных отходах, их опасности и влиянии на состояние здоровья.

Методы исследования. С помощью валеолого-диагностического метода обследовано 80 респондентов-студентов медицинского университета в возрасте 18-24 лет.

Результаты и их обсуждение. Считают опасной для здоровья угрозу радиационной опасности на современном этапе 68% студентов. Допускают, что РАО могут загрязнять воду, почву и попадать в продукты питания 96% респондентов. Среди основных последствий этого, по мнению 97,8%, онкологические заболевания, 96% – мутации и 94,4% – влияние на наследственность. Наиболее авторитетный источник информации о РАО – это эксперт для 53,3% респондентов, далее средства массовой информации – для 45,4% и экологические движения – для 13,3%. При этом 63,3% респондентов оценили свой уровень осведомленности о РАО как средний.

Выводы. Результаты исследования показывают, что современная молодежь, не имеющая специальной подготовки, недостаточно ориентируется в вопросах влияния на организм человека радиационных последствий загрязнения окружающей среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Радиоактивные отходы воздействие на человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru-ecology.info/term/77587/>. – Дата доступа: 20.02.2021.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНРЕАЛЬСКОЙ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ВРАЧОМ-ПСИХИАТРОМ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СОМАТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Конкина А. Д.¹, Лутцева О. И.²

Гродненский государственный медицинский университет¹,
УЗ "Гродненская университетская клиника"²

Научный руководитель: Мойсеёнок Е. Н.

Актуальность. По данным ВОЗ, деменция является одной из основных причин инвалидности пожилых людей во всём мире. В настоящее время не существует специфической терапии деменции, однако ранняя диагностика, коррекция поведенческих нарушений дают возможность прогнозировать течение заболевания в каждом конкретном случае.

Цель. Изучить частоту использования врачом-психиатром многопрофильного соматического стационара (на примере УЗ «Гродненская

университетская клиника») психодиагностических методик исследования когнитивных функций, повысить осведомлённость о возможностях ранней диагностики деменции и дальнейшей тактике ведения пациента.

Методы исследования. Изучена и проанализирована первичная медицинская документация психиатрического кабинета УЗ «ГУК» за 24 месяца (январь 2019 г. – декабрь 2020 г.): журнал учета консультаций, журнал использования психодиагностических методик.

Результаты и их обсуждение. За 24 месяца работы врачом-психиатром-наркологом принято 48 пациентов с проявлениями деменции (1,14% от общего количества пациентов). Всем было проведено психодиагностическое исследование когнитивных функций с использованием Монреальской шкалы оценки когнитивных функций. У 46 из 48 обследованных результат составил ниже 26 баллов (норма – 26-30 баллов). Всем пациентам в условиях стационара назначено симптоматическое лечение, а на амбулаторный этап их родственникам даны рекомендации: обращение к участковому психиатру с целью более детальной диагностики, наблюдения и подбора препаратов, возможного установления группы инвалидности.

Выводы. Монреальская шкала оценки когнитивных функций наиболее приемлема для использования в соматическом стационаре в качестве скринингового теста, так как занимает немного времени (около 10 минут), достаточно проста для использования и минимизирует риск врачебной субъективности в постановке диагноза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ассанович, М. А. Клиническая психодиагностика / М. А. Ассанович. – Минск, 2012. – 343 с.
2. Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб.: Речь, 1999. – 543 с.

ПРОБЛЕМА ДВОЙСТВЕННОСТИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕРЕД МАТЕРЬЮ И ПЛОДОМ В ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Конончик А. Э.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Королёнок Л. Г.

Актуальность. Рассмотрение этических вопросов, возникающих при пренатальном диагностическом тестировании, требует четкого понимания целей процесса тестирования. В контексте беременности тестирование может быть направлено на мать, плод или и на обоих. Цели тестирования будут