

4 (30 м от оживленной автомобильной трассы) больше, чем в точке 3 (тропа здоровья в ур. Пышки), а значит и степень загрязнения атмосферного воздуха в данной зоне ниже.

На 2 и 4 участках после сбора хвои можно было наблюдать черные пятна на пальцах (остатки топлива автомобилей, выгоревшие не до конца). К таким остаткам относятся: сажа – аморфный углерод, микрочастицы (Fe, Pb, Cr, Zn, Sr), макрочастицы (преимущественно Fe-содержащие). Так же на 1 участке хвоя короткая и редкая, что свидетельствует о сильном газодымовом загрязнении.

Выводы. Результаты исследования наглядно показывают, что на участках с интенсивным движением авто- и железнодорожного транспорта воздух заметно загрязнен по сравнению с зоной рекреации, что оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения в городе Гродно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Использование биоиндикаторов для оценки состояния атмосферного воздуха / Бозшатаева Г. Т. [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 12. – С. 302–306.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ И ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ К СКУКЕ

Кречик П. С.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: магистр психол. наук Саков В. М.

Актуальность. Роль психической саморегуляции в жизни человека достаточно велика, так как практически вся жизнь состоит из многочисленных форм деятельности и других видов целенаправленной активности. От степени совершенства процессов саморегуляции зависит успешность и конечный исход любого акта произвольной активности.

Цель. Выявить характер взаимосвязи осознанной саморегуляции поведения и предрасположенности личности к скуке.

Методы исследования. Теоретические методы: анализ, синтез, классификация, обобщение, прогнозирование. Методики: «Стиль саморегуляции поведения», разработанная В. И. Моросановой, «Предрасположенность к скуке», адаптированная П. Р. Галузо, В. М. Саковым (оригинальный вариант «BoredomPronenessScale» Farmer, Sundberg). Эмпирическая база: 17 мужчин и 33 женщины (от 18 лет до 50 лет).

Результаты и их обсуждение. Субъекты, характеризующиеся средним уровнем осознанной саморегуляции поведения, не отличаются от субъектов с

высоким уровнем по критерию предрасположенности к скуке как личностной диспозиции ($p > 0.05$). Субъекты, характеризующиеся низким уровнем осознанной саморегуляции поведения, не отличаются от субъектов со средним уровнем по критерию предрасположенности к скуке как личностной диспозиции ($p > 0.05$). Отличия наблюдаются только у групп с низким и высоким уровнем саморегуляции по критерию предрасположенности к скуке как личностной диспозиции.

Выводы. Различия в степени выраженности предрасположенности к скуке между субъектами мужского и женского пола отсутствуют. Различия в характере выраженности процессов осознанной саморегуляции поведения между субъектами мужского и женского пола отсутствуют. Между переменными «Общий уровень предрасположенности к скуке» и «Осознанная саморегуляция поведения» существует взаимосвязь.

ЛИТЕРАТУРА

1. Егоров, И. А. Принцип свободы как основание общей теории регуляции / И. А. Егоров // Вопросы философии. – №3. – 2000. – С.3–22.
2. Посохова, С. Т. Скука как особое психическое состояние человека / С. Т. Посохова, Е. В. Рохина // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. – 2009. – Ч. 1. – С. 9–15.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ

Кривицкая К. Н.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Цилиндзь И. Т.

Актуальность. Не теряет своей актуальности лечение паховых грыж. Заболеваемость паховыми грыжами остается высокой и, более того, по данным ряда авторов, она имеет тенденцию к росту [1,2,3].

Цель. Изучить роль лапароскопической герниопластики.

Методы исследования. Представлен анализ результатов 754 лапароскопических герниопластик. Лапароскопическая герниопластика была выполнена в плановом порядке в 628 случаях односторонняя, в 63 – двухсторонняя. Мужчины составили большинство – 684 (98,9%), женщин было 7 (1,1%). В возрастном составе 49,3% (341 пациент) составили люди в возрасте 41-60 лет; 27,2 % (188 человек) – 61 год и старше; 14,2% (98 пациентов) – 21-40 лет; 9,3% (64 пациента) – 18-20 лет. Паховые грыжи были косыми в 582 случаях (77,2%), прямыми – в 172 (22,8%). В 75 случаях (9,9%) грыжи были рецидивными. Данные пациенты в прошлом были оперированы: в 72 случаях методами «натяжной» герниопластики, в 3-х случаях – по Лихтенштейну.