

Результаты и их обсуждение. В клинике применяется трансабдоминальная лапароскопическая герниопластика с расположением сетчатого трансплантата преперитонеально. Интраоперационные осложнения отмечены в 4 (0,53%) случаях. Нижняя эпигастральная артерия была повреждена в трех случаях (0,4%). В одном случае кровотечение было остановлено клипированием, в двух – чрескожным прошиванием зетобразным швом. Мочевой пузырь в его экстраперитонеальной области был поврежден в одном случае (0,13%), выполнено ушивание и эпицистостома. В послеоперационном периоде 19 случаях (2,5%) образовались серомы по ходу семенного канатика, которые были устранены путем пункций (от 1 до 5). У 8 пациентов (1,1%) выявлен рецидив.

Выводы. Лапароскопическая герниопластика является операцией выбора при лечении паховых грыж. Она позволяет снизить частоту рецидива заболевания за счет предотвращения натяжения тканей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жебровский, В. В. Хирургия грыж живота. – М., 2005.
2. Николаев, Н. Е., Алексеев, С. А. Классификация, этиопатогенез и выбор способов хирургического лечения паховой грыжи // Здоровоохранение. – 2014. – № 12. – С. 36–39.
3. Тоскин, К. Д., Жебровский, В. В. Грыжи живота. – М., 1983.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Крупница М. С.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Зарецкая Е. С.

Актуальность. Рак мочевого пузыря (далее РМП) – это злокачественная опухоль, происходящая из слизистой оболочки или стенки мочевого пузыря, основными проявлениями которой является гематурия, дизурия и боли над лобком. РМП является распространенным заболеванием, занимая в структуре мировой онкологической патологии 11-е место. Несмотря на обилие специальных исследований, в том числе, проведенных в последние десятилетия, проблема опухолей мочевого пузыря не теряет своей актуальности. Актуальность проблемы в том, что в большинстве случаев опухоли появляются снова, однако только 10-20% случаев наблюдается прогрессия до мышечно-инвазивного РМП [1].

Цель. Оценить возможности современных методов лучевой диагностики в визуализации опухолей мочевого пузыря.

Методы исследования. Анализ медицинских карт пациентов (форма №003/у-07) УЗ «Гродненская университетская клиника» с диагнозом С-67. Злокачественное новообразование пузыря. Медиана наблюдения 12 месяцев.

Результаты и их обсуждение. При анализе архивных данных были отобраны 36 пациентов с раком мочевого пузыря. Первично для постановки диагноза 35 пациентам (97%) было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ). У 12 пациентов (33%) УЗИ не позволило достоверно поставить диагноз, поэтому этим пациентам была выполнена МРТ. Наибольшие трудности имеет правильность установки стадии инвазии, особенно при T1 и T4. Большое значение в этом имеет эндоскопическое исследование с биопсией. При этом степень опухоли была правильно установлена в 21% при T1 и в 19% при T4. Наибольшее совпадение выявлено при стадии T3b (64%). При стадии T2a было правильно установлено в 31% случаев. При УЗИ чувствительность в определении степени инвазии опухоли в стенку пузыря составила только 43%.

Выводы. УЗИ остается первичным методом для выявления РМП. МРТ и другие методы позволяют более детально оценить размер опухоли и степень ее инвазии в стенку.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jemal A., Global cancer statistics / A. Jemal, F. Bray and all // CA Cancer J Clinic. – 2011. – P. 69–90.

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

Кузьминова М. В.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: магистр психол. наук Полудень Н. Л.

Актуальность. В изменившейся социальной ситуации человек стремится выработать и принять такие ценности, жизненные ориентиры, которые позволили бы ему найти свое место и самоопределиться. В связи с этим становится актуальной задача изучения жизненных ценностей-ориентиров жизни и поведения человека. От того, какие интересы, взгляды, ценности преобладают, зависит дальнейшее социально-экономическое, политическое и культурное развитие общества и государства в целом.

Цель. Выявить предпочитаемые и отвергаемые жизненные ценности студентов.

Методы исследования. Анализ психологической литературы, анкетирование, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, статистическая обработка результатов исследования.