

2. Чеховский, А. Л. Оценка радоновой опасности по косвенным показателям радона (на примере восточных областей Беларуси): автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.01.01 [Электронный ресурс] / А. Л. Чеховский ; Бел. гос. ун-т. – Минск, 2017. – С. 16. – Режим доступа: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/189781>. – Дата доступа: 24.02.2021.

К ВОПРОСУ О ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ПСОРИАЗОМ ПРИ ЛИЦЕВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ

Подгорная Л. А.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Маркевич Е. Б.,
д-р мед. наук, проф. Хворик Д. Ф.

Актуальность. Проблема психических расстройств при лицевых дерматозах представляет научный интерес. Вовлечение в процесс кожи лица является маркером тяжелого течения псориаза, длительность которого может приводить к развитию психических расстройств и избегающего поведения.

Цель. Изучить влияние кожных болезней на развитие психических расстройств у пациентов.

Методы исследования. Изучение, анализ и обобщение литературных источников по выбранному научному направлению.

Результаты и их обсуждение. С древних времен пациенты с поражением видимых участков кожи подвергались стигматизации. В средние века пламенеющий невус области лица считался признаком одержимости дьяволом [1]. С течением времени предрассудки изменились по содержанию, но сохранились до наших дней, что отразилось на поведении и психическом состоянии пациентов с лицевыми дерматозами.

Наибольший процент психических расстройств отмечается среди женщин с преимущественными лицевыми поражениями [2]. Реакции с наличием социофобий и сенситивных идей отношения у пациентов с хроническими дерматозами часто сопровождаются болезненным восприятием косметического дефекта, идеями неполноценности [3]. Изучение пациентов с хроническими дерматозами, включая дерматозы лицевой локализации (розацеа, псориаз), показало преобладание у них депрессивных реакций, социофобий и сенситивных идей отношения. Психологическое обследование пациентов с акне лицевой локализации выявило заниженную самооценку, стремление к самоизоляции и высокий уровень тревоги. При этом все пациенты являлись единственными детьми в семье и отличались высокой самооценкой до проявления первых признаков заболевания [4].

Выводы. Косметические дефекты на лице, хроническое течение заболевания, отношение окружающих способствуют формированию

психических расстройств у пациентов с псориазом, ухудшающих качество их жизни и приводящих к дезадаптации в обществе, принятию своей внешности. Знания врачей о психических переживаниях пациентов помогут избежать поиска ими новых методов самолечения и повысить доверие к врачам, что позитивно скажется на результатах лечения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Lanigan, S. W. Psychological disabilities amongst patients with port wine stains / S. W. Lanigan, J. A. Cotterill // *British Journal of Dermatology*. – 1989. – Т. 121, № 2. – С. 209–215.
2. Renzi, C. Factors associated with patient satisfaction with care among dermatological outpatients / C. Renzi [et al.] // *British Journal of Dermatology*. – 2001. – Т. 145, № 4. – С. 617–623.
3. Ипохондрия *sinemateria* как психосоматическая проблема (на модели ипохондрических расстройств, реализующихся в пространстве кожного покрова) / А. Б. Смулевич [и др.] // *Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова*. – 2012. – Т. 112, № 1. – С. 14–25.
4. Capoor, H. S. Does psychological intervention help chronic skin conditions? / H. S. Capoor, C. M. R. Payne C. M. R., D. Goldin // *Postgraduate medical journal*. – 1998. – Т. 74, № 877. – С. 662–664.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ВЫЯВЛЕНИЯ

Подгорная Л. А., Будько А. Ю., Будько Е. Ю.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Каравай А. В.

Актуальность. Рак молочной железы является одной из наиболее распространенных форм злокачественных новообразований в мире и занимает второе место в структуре заболеваемости онкологией среди женского населения Республики Беларусь [1]. Рак молочной железы (РМЖ) – неоднородная группа опухолей, которые отличаются этиологией, морфологической картиной, клиническим течением и чувствительностью к проводимому лечению.

Цель. Изучить молекулярные особенности РМЖ в зависимости от способа выявления: по обращению и при маммографическом скрининге.

Методы исследования. В исследование включена 91 пациентка, которым в 2014-2019 года установлен диагноз рак молочной железы. Пациентки были разделены на две группы: в первую группу вошли пациентки с клинически определяемой опухолью (32 пациентки), вторую составили пациентки, у которых РМЖ был выявлен при скрининге (59 пациенток). Средний возраст в