

психических расстройств у пациентов с псориазом, ухудшающих качество их жизни и приводящих к дезадаптации в обществе, принятию своей внешности. Знания врачей о психических переживаниях пациентов помогут избежать поиска ими новых методов самолечения и повысить доверие к врачам, что позитивно скажется на результатах лечения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Lanigan, S. W. Psychological disabilities amongst patients with port wine stains / S. W. Lanigan, J. A. Cotterill // *British Journal of Dermatology*. – 1989. – Т. 121, № 2. – С. 209–215.
2. Renzi, C. Factors associated with patient satisfaction with care among dermatological outpatients / C. Renzi [et al.] // *British Journal of Dermatology*. – 2001. – Т. 145, № 4. – С. 617–623.
3. Ипохондрия *sinemateria* как психосоматическая проблема (на модели ипохондрических расстройств, реализующихся в пространстве кожного покрова) / А. Б. Смулевич [и др.] // *Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова*. – 2012. – Т. 112, № 1. – С. 14–25.
4. Capoor, H. S. Does psychological intervention help chronic skin conditions? / H. S. Capoor, C. M. R. Payne C. M. R., D. Goldin // *Postgraduate medical journal*. – 1998. – Т. 74, № 877. – С. 662–664.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ВЫЯВЛЕНИЯ

Подгорная Л. А., Будько А. Ю., Будько Е. Ю.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Каравай А. В.

Актуальность. Рак молочной железы является одной из наиболее распространенных форм злокачественных новообразований в мире и занимает второе место в структуре заболеваемости онкологией среди женского населения Республики Беларусь [1]. Рак молочной железы (РМЖ) – неоднородная группа опухолей, которые отличаются этиологией, морфологической картиной, клиническим течением и чувствительностью к проводимому лечению.

Цель. Изучить молекулярные особенности РМЖ в зависимости от способа выявления: по обращению и при маммографическом скрининге.

Методы исследования. В исследование включена 91 пациентка, которым в 2014-2019 года установлен диагноз рак молочной железы. Пациентки были разделены на две группы: в первую группу вошли пациентки с клинически определяемой опухолью (32 пациентки), вторую составили пациентки, у которых РМЖ был выявлен при скрининге (59 пациенток). Средний возраст в

группах составил 61 года. Всем пациенткам выполнено оперативное вмешательство и установлен молекулярно-генетический тип РМЖ.

Результаты и их обсуждение. При анализе данных, полученных при иммуногистохимическом исследовании операционного материала, в обеих группах преобладали более благоприятные – люминальные типы РМЖ. В то же время доля более агрессивных типов РМЖ в исследуемых группах различалась. Так в группе пациенток, у которых РМЖ установлен при обращении, доля HER2-позитивного и Triplenegative составила 21,9% и 12,5% соответственно. В группе маммологического скрининга доля HER2-позитивного и Triplenegative составила лишь 4,8% и 9,5% соответственно.

Выводы. Различия в структуре молекулярных типов РМЖ при различных способах выявления возможно объяснить разными темпами роста указанных форм рака: так более благоприятные типы, ввиду медленного роста чаще выявляются при скрининге, в то время как агрессивные типы, в силу значительной скорости роста успевают достичь размеров клинически определяемой опухоли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Статистика онкологических заболеваний в Республике Беларусь (2007-2016) / под ред. О.Г. Суконко. – Минск : РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, 2018. – 286 с.

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВСОЧЕТАНИЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «КАРДИОХИРУРГИЯ» (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Подольанский И. П., Данилевич М. А.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Волошко Т. А.

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена необходимостью преодоления языкового барьера между исследователями из разных стран, работающими в данной предметной области.

Цель. Целью исследования является установление закономерностей и особенностей структуры англоязычных терминов и их классификация для обеспечения простоты их восприятия русскоязычным пользователем.

Методы исследования. При исследовании терминологического материала применялись такие лингвистические методы, как метод структурного анализа, метод квантитативного анализа, дистрибутивный метод.