

распространённости курения среди студенческой молодёжи. Вероятно, он отражает боязнь осуждения курящих девушек (стигматизации).

#### ЛИТЕРАТУРА

1. XueF, [etal]. Cigarette smoking and the incidence of breast cancer. Archives of Internal Medicine 2011; 171:125–133.
2. Trimble CL, [et al]. Active and passive smoking and the risk of cervical neoplasia. Obstet Gynecol 2005;105:174–81.
3. Kapeu AS, [et al]. “Is smoking an independent risk factor for invasive cervical cancer?” A nested case-control study within Nordic biobanks. Am J Epidemiology 2009; 169: 480–8.
4. Marchbanks PA, [et al]. Cigarette smoking and epithelial ovarian cancer by histologic type. Obstet Gynecol 2000;95:255–60.
5. T. Nelson [et al]. Cigarette smoking is associated with an altered vaginal tract metabolomic profile. Nature, Scientificreports, 2018.

## ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ И РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

**Ходкевич К. В.**

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. психол. наук, доц. Воронко Е. В.

**Актуальность.** В индивидуальных особенностях саморегулирования отражается то, как человек планирует и программирует достижение цели, учитывает значимые условия окружающей действительности, оценивает и корректирует собственную активность, стремясь получить субъективно приемлемые результаты. Рискованное поведение – это особый стиль поведения, который с высокой степенью вероятности может привести к потере здоровья, физическому или социальному благополучию личности.

**Цель.** Установить характер взаимосвязи между рискованным поведением и осознанной саморегуляцией личности.

**Методы исследования.** Респонденты 50 студентов 1 курса ГрГМУ в возрасте 17-20 лет (29 девушек, 21 юноша). Методики: «Рискованное поведение подростков» (Карпинский К. В., Галузо П. Р., Кольшко А. М.); «Стиль саморегуляции поведения ССП-98» (В. И. Моросанова, Е. М. Коноз).

**Результаты и их обсуждение.** У студентов 1 курса преобладает средний уровень осознанной саморегуляции (у 54%), низкий уровень у 22%, высокий уровень у 24%. При анализе показателей рискованного поведения выявлено, что преобладают низкий (24%) и очень высокий (24%) уровни проявления рискованного поведения, средний уровень у 22%, высокий у 20%, у 10% респондентов очень низкий уровень рискованного поведения. Не обнаружена значимая корреляционная связь между показателями ( $r=0,204$ ,  $p>0,05$ ).

**Выводы.** Ведущих тенденций в проявлении рискованного поведения студентов ГрГМУ выявить не удалось. Констатированы особенности саморегуляции: сформирована потребность в осознанном планировании деятельности, планы реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно; студенты способны выделять значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется в соответствии программ действий планам деятельности, соответствии получаемых результатов принятым целям; не в полной мере сформирована как потребность продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, так и устойчивость субъективных критериев оценки результатов.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Моросанова, В. И. Индивидуальный стиль саморегуляции: феномен, структура и функции в произвольной активности человека / В. И. Моросанова. – М.: Наука, 2001. – 192 с.

## СТРУКТУРА ТЕРМИНОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МЕДИЦИНА БОЛИ»

**Храмец А. С.**

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. филол. наук Разводовская Я. В.

**Актуальность.** Медицина боли (далее – МБ) – направление медицинской практики, которая занимается многоплановым и многокомпонентным лечением боли, ее предотвращением, а также оценкой и реабилитацией людей, страдающих от боли. Активное развитие самой предметной области (далее – ПО) МБ, формирование ее основной терминологии актуализируют вопросы терминологических исследований в рамках самой ПО МБ и ее подобластей.

**Цель.** Описание структурных особенностей терминов ПО МБ.

**Методы исследования.** В ходе исследования использован структурный анализ, анализ дефиниций.

**Результаты и их обсуждение.** Путем сплошной выборки мы отобрали 159 англоязычных и 122 русскоязычных термина. Однокомпонентными терминами признаны 57 англоязычных (35,8%) и 38 русскоязычных (31,1%). Из них простыми терминами оказались 27 англоязычных (16,9%) и 24 русскоязычных (19,6%). Среди простых терминов выявлено 5 англоязычных терминов с производной основой (3,14%) и 4 русскоязычных (3,27%). Терминов с производной основой выявлено 22 англоязычных (13,8%) и 20 русскоязычных (16,39%). Основными терминообразующими компонентами простых терминов оказались суффиксы. Сложными терминами в исследуемой