

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ТАЗА МАТЕРИ

Цеслюкевич Ю. Ю.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Заборовский Г. И.

Актуальность. Проблема часто встречается в практическом акушерстве. Увеличивается возраст первородящих женщин, что предполагает наличие у них сопутствующей патологии и осложнений течения беременности и родов.

Цель. Определить влияние течения беременности и родов на возникновение клинически узкого таза.

Методы исследования. На основании литературы были составлены анкеты для пациенток с диагнозом несоответствия размеров таза. Анализ анкет проведён у 95 пациенток (71 первородящие, 24 повторнородящие) по критериям: возраст, резус фактор, прибавка в массе тела за беременность, вредные привычки, порядковый номер беременности, особенности беременности и родов. Выборки из анкет обработаны статистическими алгоритмами для выявления общих закономерностей.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст рожениц $27,2 \pm 0,34$. Прибавка массы тела $13,2 \pm 0,4$ кг. Резус-фактор положительный в 78,9%, отрицательный 21,1%. Особенности диагноза в общей группе (95 пациенток): без особенностей 23,2%, наличие крупного плода у 49,5%, неправильное предлежание плода 16,9%, гестоз 6,3%, равномерно суженный таз 3,2%, инфекции половых путей 3,2%, несостоятельный рубец на матке 3,2%. Особенности течения беременности: без особенностей 28,4%, угроза прерывания беременности 24,2%, инфекции мочеполовой системы 19,0%, токсикоз 12,6%, гестоз 1,1%. Осложнения родов в общей группе: без осложнений 24,2%, преждевременный разрыв плодных оболочек 10,5%, клинически узкий таз 72,6%, преждевременное излитие околоплодных вод 23,2%, многоводие 8,4%, слабость родовой деятельности 5,3%. Порядковый номер беременности: в среднем $1,46 \pm 0,1$; первородящие женщины составляют 74,7%.

Выводы. На несоответствие размеров таза матери могут оказывать влияние: возраст женщин старше 27 лет, прибавка в массе тела около 13 кг, наличие крупного плода или неправильного предлежания, угроза прерывания беременности, первая беременность, инфекции мочеполовой системы, многоводие, токсикоз в анамнезе текущей беременности, осложнения настоящих родов в виде преждевременного разрыва плодных оболочек.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акушерство: учебное пособие / Ю. К. Малевич и др.; под общ. ред. Ю. К. Малевича. – Минск: Беларусь, 2017. – 510с.