

Выводы.

Миома матки представляет собой результат гиперпластических процессов в клетках миометрия вследствие эндокринных нарушений и изменения молекулярных взаимодействий в клетке с дисбалансом механизмов апоптоза, пролиферации и ангиогенеза [2].

ЛИТЕРАТУРА

1. Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2017: сборник материалов LXXI Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных : сб. науч. ст. / Бел. гос. мед. ун-т ; под редакцией А. В. Сикорского, О. К. Дорониной – Минск: БГМУ , 2017 – 1602 с.

2. Морфологическая характеристика миомы матки среди женщин репродуктивного возраста / Сафарова, С. М. // Журнал акушерства и женских болезней. – 2017. – Т. 66. № 1. – С. 27-31.

ЛЕЧЕНИЕ ФЛЕГМОН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ

Черняк Л. А.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Проблема лечения флегмон челюстно-лицевой области и шеи продолжает оставаться актуальной на современном этапе. Существует огромное количество разнообразных методов и способов воздействия на гнойную рану, но, к сожалению, ни один из них не удовлетворяет современных челюстно-лицевых хирургов полностью [1].

Цель. Провести сравнительный анализ различных методов местного лечения флегмон челюстно-лицевой области и шеи.

Методы исследования. Проведено лечение 62 пациентов с флегмонами челюстно-лицевой области в возрасте от 18 до 70 лет. В зависимости от метода местного лечения все пациенты были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу возрасту, распространенности, тяжести течения. Основным методом лечения у всех пациентов было широкое вскрытие и дренирование гнойных очагов и санация источника инфекции. Медикаментозная терапия включала антибактериальные, противовоспалительные десенсибилизирующие и дезинтоксикационные средства. Пациентам основной группы дополнительно местно применяли в послеоперационном периоде фотодинамическую терапию (ФДТ). Для объективной оценки эффективности лечения проводились клинико-лабораторные биохимические, бактериологические, иммунологические, цитологические исследования.

Результаты и их обсуждение. У пациентов основной группы инфильтрат рассасывался в среднем через 6 дней, в контрольной группе – через 11 дней. Отделяемое из раны прекращалось в основной группе через 3 дня, а у пациентов

контрольной группы – через 7-8 дней. Образование грануляций начиналось через 4 дня в основной группе, а в контрольной группе – через 9 дней. Все эти показатели статистически значимы ($p < 0,05$).

Выводы. Применение ФДТ в местном лечении позволяет достигнуть более раннего очищения гнойной раны, в сравнении с традиционным лечением, позволяет предупредить распространения гнойного процесса на соседние клетчаточные пространства и средостение, оказывает противовоспалительное действие.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сипкин, А. М. Одонтогенные гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области: современный взгляд на лечение и реабилитацию / Сипкин А. М., Давыдов И. А., Ахтямов Д. В., Благих О. Е. // Клиническая стоматология. -2018. -№2(86). – С. 66-69.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ КЛИНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В СТОМАТОЛОГИИ

Черняк Н. С.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Князева Ю. В.

Актуальность. Интерес к исследованию терминосистемы стоматологии связан со стремительным ростом и развитием названной области, обуславливающим появление новых терминов, синонимов, требующих уточнения их содержания, определения особенностей синонимичных единиц. Актуальность данной темы обусловлена недостаточной изученностью медицинской стоматологической терминологии; необходимостью исследований, позволяющих раскрыть и описать структурно-семантические особенности в русско-английской терминологии; а также необходимостью выявления путей формирования стоматологической терминологии в современном русском и английском языках.

Цель. Объектом исследования являются стоматологические терминологические единицы в русском и английском языках. Предмет исследования – семантические характеристики стоматологических терминов и их систематизация по тематическому признаку в терминосистемах русского и английского языков.

Методы исследования. В ходе исследования использовались следующие методы: метод наблюдения, сравнения и обобщения, семантической идентификации.

Результаты и их обсуждение. К основным тематическим группам предметной области «Стоматология» были отнесены: 1) Термины, называющие