

клинические симптомы заболеваний. В данную тематическую группу входят термины, обозначающие признаки болезни; 2) Термины, используемые в качестве названий стоматологических заболеваний; 3) Термины, обозначающие методы диагностики и лечения. В ходе исследования было рассмотрено 210 терминологических единиц, из которых 100 русских и 110 английских терминов предметной области «Стоматология».

**Выводы.** Клиническая терминология в стоматологии обогащена словами греко- латинского происхождения. Количество выделенных тематических групп в английском и русском языках совпадает. Таким образом, когнитивное представление носителей обоих языков совпадает.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Капитула, Л. С. Фармацевтическая терминология в стоматологии от возникновения до наших дней / Л. С. Капитула. – Минск: БГМУ, 2011. – 104 с.
2. Костромина, Т. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии. Учебное пособие для студентов стоматологического факультета / Т. А. Костромина, Н. И. Маркова. – Курск, 2011. – 204 с.
3. Мерещак, Н. Г. Латинская стоматологическая клиническая терминология: Учебно-методическое пособие / Н. Г. Мерещак, И. Ю. Карпук. – Витебск. Издательство ВГМУ. – 2019. – 212 с.

## АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕПИНГ-ТЕСТА У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ПСИХОТИПАМИ

**Четырко Е. С., Томчук М. С.**

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Троян Э. И.

**Актуальность.** Психологическому стрессу отводят важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенная нервная возбудимость, нарушения нервной системы, возникают когда человек находится в стрессовой ситуации, недосыпает, возбужден, находится в конфликте с окружающими. Иногда причина нервной возбудимости в определенном психотипе человека.

**Цель.** Изучение влияния психотипа личности на результаты теппинг-теста для определения свойств нервной системы по психомоторным показателям.

**Методы исследования.** Исследование проводилось у 22 девушек-студенток 19-20 лет. Тип личности определяли с помощью опросника по методике Айзенка EPQ. Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Сильная

нервная система выдерживает большую по величине и длительности нагрузку, чем слабая. Методика теппинг-теста основана на определении динамики максимального темпа движения рук. Опыт проводится последовательно – сначала правой, а затем левой рукой. Полученные в результате варианты динамики максимального темпа условно разделяются на пять типов.

**Результаты и их обсуждение.** При интерпретации данных, полученных в результате тестирования, показатели 5-х студенток (группа 2) по шкале экстраверсии-интроверсии 12 девушек набрали более 16 баллов, что характеризует их как типичных экстравертов, и 10 девушек от 7 до 12 баллов.

При оценке результатов теппинг-теста у лиц с ярко выраженной экстравертностью (группа 2) установлен ровный тип – максимальный темп удерживается примерно на одном уровне в течение всего срока проведения теста, такой тип кривой характеризует нервную систему обследуемого как нервную систему средней силы. У девушек-интровертов темп теста снижается уже с 6 секунды и остается сниженным, что свидетельствует о слабости нервной системы обследуемого.

**Выводы.** Полученные результаты свидетельствуют о повышенной вегетативной реактивности, что свидетельствует о напряжении вегетативной нервной системы.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Гогин, Е. Е. Артериальная гипертония или гипертоническая болезнь: аргументы в пользу нозологического диагноза / Е. Е. Гогин, И. В. Мартынов // Терапевтический архив. – 2000. – Том 72, № 4. С. 5-8.
2. Макарова, Л. П. Некоторые вопросы укрепления здоровья работающих подростков / Л. П. Макарова, Ю. К. Бахтин, А. В. Соловьёв. —// Молодой ученый. – 2014. – № 4 (63). – С. 370-372.

## РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ОСТРЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

**Шавейко Т. В.<sup>1</sup>, Денисик Д. С.<sup>1</sup>, Дойлидо М. А.<sup>1</sup>, Миронова Ю. Н.<sup>2</sup>**

УЗ "Гродненская университетская клиника"<sup>1</sup>,  
Гродненский государственный медицинский университет<sup>2</sup>

Научный руководитель: Ракова С. Н.

**Актуальность.** Известно, что более 90% детей переносят ОСО в первые 5 лет жизни. ОСО у детей имеет тенденцию к рецидивирующему течению [1]. Из наших предыдущих исследований ясно, что у детей с экссудативным средним отитом в анамнезе имелись рецидивирующие средние отиты [2].