

Цель. Оценить данные семейного анамнеза для определения индивидуального риска развития онкопатологии.

Методы исследования. Проведено исследование на основе оригинальной анкеты-опросника 261 студенток ГрГМУ. Статистическая обработка данных проводилась в Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ анкет девушек, из которых 98% относят себя к белорусской национальности, средний возраст составил 22 года. Семейный онкоанамнез отягощен у 153 человек. При этом у 40 девушек имели место 3 и более случаев онкопатологии в семье, у 60 – 2, у 54 – 1. У 57 респондентов семейный анамнез отягощен по материнской линии, у 26 – по отцовской, у 36 девушек – по обеим линиям. Опухоли женской репродуктивной системы встречались чаще других – у 89 родственников девушек, в том числе 68 случаев рака молочной железы. Онкопатология дыхательной системы отмечена в 60 анкетах, преимущественно у мужчин (51 из 60).

Выводы. В результате нашего исследования выявилось, что для людей, родственники которых болели онкозаболеваниями, необходимо проведение дополнительных исследований для подтверждения генетической предрасположенности к онкопатологии; предложить части респондентам проведение определенных молекулярно-генетических тестов, основываясь на особенностях семейного онкоанамнеза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gudmundsdottir K., Ashworth A. // Oncogene. – 2016. – V. 25. – P. 5864–5874.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКОТЕРАПИИ КАК МЕТОДА ОБЛЕГЧЕНИЯ БОЛИ В I ПЕРИОДЕ РОДОВ

Швайковский А. В., Левин В. И., Лукша А. Н., Мишкова А. П.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Музыкотерапия (МТ) – это медицинское направление, использующее музыку для лечения и профилактики заболеваний. Музыка влияет на артериальное давление, частоту сердечных сокращений, дыхание и эндокринную систему. В акушерстве МТ используется для повышения порога болевой чувствительности в родах. Использование МТ в I периоде родов и в послеродовом периоде улучшает психосоматическое состояние женщин, настроение, сон, дает бодрость, прилив сил, облегчает течение родов.

Цель. Изучить состояние рожениц и интенсивность болевых ощущений в I периоде родов при использовании МТ.

Методы исследования. Объектом исследования стали 50 рожениц, которым в I периоде родов было предложено прослушивание музыкальных композиций согласно их предпочтениям. Затем пациентки оценивали уровень болевых ощущений по аналоговой шкале интенсивности боли (от 0 до 10 баллов).

Результаты и их обсуждение. Получены следующие данные: 34 пациентки (68% от общего количества) подтвердили эффективность данного метода для снижения боли в I периоде родов, 10 рожениц (20%) высказались об отсутствии положительного эффекта, 6 пациенток (12%) от проведения МТ отказались.

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии МТ на психоэмоциональное состояние рожениц, снижении боли во время схваток и выраженном расслабляющем эффекте. Все это служит основанием для дальнейшего изучения применения МТ в акушерстве.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шушарджан, С. В. Руководство по музыкотерапии / С.В.Шушарджан. – М.: Медицина, 2005. – 478 с.

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Швайковский А. В., Левин В. И., Санталова Н. А., Ягелло К. Г.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Беременная Ж., 1993г.р., поступила в учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» 23.10.2020 г., в сроке беременности 208 дней, с жалобами на боли в поясничной области справа, общую слабость. Хронические заболевания: хр. гастрит в стадии ремиссии, хр. калькулезный холецистит, хр. смешанный геморрой II степени, анемия ср. ст. тяжести (существовавшая до беременности). 27.10.20 выполнено МРТ: МР-признаки осложнённого острого аппендицита с наличием аппендикулярного инфильтрата, асцита, кишечной непроходимости, реактивного панкреатита. Принято решение об оперативном лечении. Выполнена правосторонняя гемиколонэктомия с резекцией подвздошной кишки и наложением илеотрансверзоанастомоза. 28.10.2020 УЗИ: антенатальная гибель плода. Решено: роды вести через естественные родовые пути, с перидуральной анестезией, профилактикой кровотечения в III периоде родов. В послеродовом периоде произведено выскабливание полости матки. Послеоперационный период без особенностей. Гистология №43040 от 30.10.2020: недифференцированный мелкоклеточный рак.