

Российское общество холтеровского мониторинга
и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ)
Российское кардиологическое общество (РКО)
Федеральное Медико-Биологическое Агентство (ФМБА России)
Нижегородская государственная медицинская академия

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

**18-го КОНГРЕССА
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ХОЛТЕРОВСКОГО
МОНИТОРИРОВАНИЯ И НЕИНВАЗИВНОЙ
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИИ (РОХМиНЭ)**

**10-го ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОЛОГИЯ»**

**III-ей ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ДЕТСКИХ КАРДИОЛОГОВ ФМБА РОССИИ**

26–27 апреля 2017
г. Нижний Новгород

УДК 616.1
ББК 54.101/102
П 784

Сборник тезисов 18-го Конгресса Российского общества холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ), 10-го Всероссийского Конгресса «Клиническая электрокардиология», III-ей Всероссийской конференции детских кардиологов ФМБА России, 26–27 апреля 2017, г. Нижний Новгород – М.: Издательство Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовского Университета), 2017, 128 с.

Все материалы в сборнике опубликованы в редакции авторов.



© РОХМиНЭ, 2017
© ООО «Триалог», 2017

ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННЫХ

Гурина Л.Н., Бурак Е.А.

*Учреждение образования «Гродненский
государственный медицинский университет», Гродно,
Республика Беларусь
anlunag@rambler.ru*

Актуальность. Нарушения ритма сердца у младенцев составляют 1-2% в структуре заболеваемости детей первых месяцев жизни. Трудности диагностики нарушений ритма сердца у новорожденных диктуют определение факторов риска, срыва сердечной деятельности.

Цель. Изучить течение беременности матерей, у детей которых, в периоде новорожденности диагностированы нарушения сердечного ритма.

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 35 историй болезни новорожденных с нарушениями сердечного ритма, которые находились на лечении и обследовании в Гродненской областной детской клинической больнице.

Результаты. В результате проведенного исследования было выявлено, что нарушение ритма сердца у новорожденных проявлялось экстрасистолией в 65,9% случаев, пароксизмальной тахикардией – 14,3%, АВ-блокадами у 11,43% детей, другие нарушения сердечного ритма составили 8,55%.

Анализ материнского анамнеза показал, что осложнения течения беременности были диагностированы у 97% обследованных. Беременность с угрозой прерывания наблюдалась у 25,7% женщин. Хроническая фетоплацентарная недостаточность развилась у восьми матерей (22,85%), многоводие у трех беременных (8,6%). Гестоз диагностирован в 17,1% случаев.

Экстрагенитальная патология была у 50% женщин. Заболевания ЛОР-органов и органов дыхания выявлены у 26,0% обследуемых, хроническая герпетическая инфекция на фоне беременности встречалась у 8,6% женщин, в 14,3% случаев беременность сочеталась с анемией. Генитальная инфекция диагностирована у 17,1% беременных.

Заключение. Таким образом, изучение материнского анамнеза позволило определить показатели пренатального периода, которые имеют тесную взаимосвязь с заболеваниями периода новорожденности. Течение

беременности на фоне угрозы прерывания, хронической фетоплацентарной недостаточности, гестоза, анемии, инфицирования герпетической инфекцией, заболеваний верхних дыхательных путей и ЛОР органов оказывает неблагоприятное воздействие на плод и приводит к нарушению сердечного ритма у новорожденного.