

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОК С ПОЛИПАМИ ЭНДОМЕТРИЯ

Ткачик Ю.А.

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Кафедра акушерства и гинекологии

Научный руководитель – доцент Гурин А.Л.

Актуальность. Появление полипов эндометрия часто связано с перенесенными родами. Однако в последние годы обнаруживаются у девушек подросткового возраста и у женщин в постменопаузе. Клинически проявляется кровотечениями (межменструальные, пременструальные), нарушением менструального цикла, сильными схваткообразными болевыми ощущениями. Маленькие полипы протекают бессимптомно и часто диагностируются случайно. Образования больших размеров могут быть причиной бесплодия у женщин репродуктивного возраста.

Цель: анализ анамнестических данных женщин с полипами эндометрия и шейки матки и оценка эффективности выявления патологии.

Материалы и методы исследования. Проведена ретроспективная оценка 20 историй болезни женщин с подозрением на полипы эндометрия или полипы шейки матки, прооперированных в УЗ «Городская клиническая больница №4 г.Гродно» в октябре 2009 года.

Результаты исследования. Наблюдались женщины от 23 до 77 лет. 50% – женщины в возрасте 36–45 лет. В 95% – трудоспособного возраста, среди них 85% – служащие и рабочие. 20% женщин предъявляют жалобы на повышенное давление. 10% – жалобы со стороны ЖКТ. 50% отмечают в анамнезе только простудные заболевания, 55% страдают избыточной массой тела. Менархе – у 45% с 14 лет, преобладает продолжительность 4–7 дней (75%). У 30% наблюдаемых в анамнезе не было беременностей, а у 60% – 2 или 3 беременности. Преобладают женщины после первых и вторых родов (78%). 55% женщин имеют в анамнезе аборт. Наблюдаемые поступали в стационар с диагнозом миома матки (60%), из них у 78% в сочетании с бесплодием или полипом эндометрия; 20% – киста яичника, и по 10% неполное выпадение матки, самопроизвольный выкидыш, диффузное маточное кровотечение. У 65% после выполнения оперативного вмешательства (55% – РДВ матки; 10% – Лапаротомия экстирпация матки без придатков; 20% – Лапароскопическая цистэктомия; 10% – Лапароскопическая миомэктомия), был подтвержден гистологическим исследованием диагноз полип эндометрия.

Выводы. Чаще полипами эндометрия страдают женщины репродуктивного возраста без тяжелой сопутствующей патологии со стороны других органов и систем, но с отягощенным гинекологическим анамнезом. В выявлении патологии шейки матки и эндометрия высокую эффективность показывает осмотр с помощью гинекологических зеркал, кольпоскопия в сочетании с ультразвуковым сканированием.

Литература:

1. Бодяжина В.И., Семенченко И.К. Акушерство. – М.: Феникс. 2009.
2. Славянова И.К. Акушерство и гинекология. – М.: Феникс. 2009.
3. Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., Байсов Б.И. Гинекология: учебник.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.

ЖАНЧЫНЫ Ў СЯМ'І РАДЗІВІЛАЎ: СОФ'Я СЛУЦКАЯ

Табалевіч А.Ю.

Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Беларусь

Кафедра гуманітарных навук

Навуковы кіраўнік – к.г.н. Чарнякевіч І.С.

У Мінскім Свята-Духавым кафедральным саборы ля паўночнай сцяны стаіць багата ўпрыгожаная разьбяная рака з мошчамі святой. Соф'я Слуцкая нарадзілася ў 1585 годзе ў сям'і Юрыя Алелькавіча і Катажыны з роду Кішкаў. Багатым і ўплывовым было тады Слуц-