

поведения выявлена у 2,5% (n=2) студентов, повышенная вероятность наличия расстройств пищевого поведения выявлена у 1,25% (n=1) студентов, высокая вероятность наличия расстройств пищевого поведения выявлена не была. Согласно «Шкалы оценки пищевого поведения» стремление к худобе было выявлено у 31,25% (n=25) студентов; стремление к булимии было выявлено у 18,75% (n=15) студентов; неудовлетворённость телом выявлена у 43,75% (n=35) студентов; ощущение общей неадекватности и неспособности контролировать собственную жизнь выявлено у 38,75% (n=31) студентов; перфекционизм выявлен у 56,25% (n=45) студентов; недоверие в межличностных отношениях выявлено у 43,75% (n=35) студентов; интроцептивная некомпетентность (дефицит распознавания чувства голода и насыщения) выявлен у 31,25% (n=25) студентов.

**Выводы.** В результате исследования выявлено, что студенты-медики имеют низкую и пониженную вероятность наличия расстройств пищевого поведения, однако более половины студентов имеют неадекватно завышенные ожидания в отношении высоких достижений, неспособны прощать себе недостатки, также достаточно высокие показатели стремления к худобе и неудовлетворённости своим телом позволяют сделать вывод о наличии проблем с самооценкой и самовосприятием среди молодежи, что может приводить к развитию расстройств пищевого поведения и ряда расстройств невротического спектра при неблагоприятных условиях.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Руководство по детской и подростковой психиатрии: в 2 т. / под ред. Джезефа М. Рея; пер. с англ. К. Мужановского. – К. : Горобец, 2018 – Т.1. – 772 с.
2. Метод донозологической диагностики дезадаптивного пищевого поведения : инструкция по применению № 176-1113, утв. М-вом здравоохранения Респ. Беларусь 05.12.2013 г. / О. А. Скугаревский. – Минск, 2013. – 8 с.

## УРОВЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ И ВРАЖДЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА УО «ГРГМУ»

**Вакулич Ю. Г.**

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Кевляк-Домбровская Л. Э.

**Актуальность.** Напряженная и неустойчивая социальная, экономическая, политическая обстановка, сложившаяся за последние десятилетия в современном мире отражается на подрастающем поколении, которое чаще встречается в школах, на улицах и в СМИ проявление агрессии и враждебности среди сверстников и взрослых.

Причина агрессивного и враждебного поведения человека связана с трансформацией социальной культуры общества, расслоением населения по социальному статусу, политическим взглядам, а также с наступившей новой реальностью, связанной с пандемией, что в свою очередь влияет на процесс ранней социализации детей и подростков. Актуальность исследования заключается в изучении проявления агрессивности и враждебности подростка, что способствует лучшему пониманию его поведения в процессе социализации.

**Цель.** Изучение уровня агрессивности и враждебности студентов 1 курса медицинского университета.

**Методы исследования.** Выборку исследования составили 40 студентов 1 курса УО «ГрГМУ» (20 юношей и 20 девушек). Прямым методом исследования стал текстовый опросник Басса-Дарки (А. Басс, А. Дарки, 1957) из 75 вопросов. Он широко используется в изучении различных форм агрессивных и враждебных реакций, а также в исследовании способности человека к самоконтролю и поведению в обществе.

Обработка результатов делится на первичную и вторичную. Первичная обработка подразумевает подсчет сырых баллов, которые высчитываются в результате сопоставления ответов опросника с ключом к тесту, где каждое совпадение считается как 1 балл. Сумма таких баллов по каждой шкале и считается «сырыми» баллами. Во вторичной обработке результатов А. А. Хван с соавторами предлагает перевод сырых баллов по каждой шкале в стены, для чего необходимо каждый сырой балл умножить на соответствующий ему коэффициент, цель которого – привести максимальное значение по каждой шкале к 100 баллам, которые будут в итоге переведены в стены. Дифференцирование результатов теста упростит интерпретацию полученных результатов по каждой шкале.

**Результаты и их обсуждение.** В ходе исследования были получены данные в общих средних значениях реакций: средний уровень физической и косвенной агрессии, а также средний уровень негативизма и обиды. Был выявлен повышенный уровень раздражительности, подозрительности, чувства вины, а также высокий уровень вербальной агрессии. Психодиагностическая методика показала наличие у 43% респондентов повышенного индекса враждебности (уровень обиды и подозрительности) и повышенного у 57% респондентов уровня индекса агрессивности (физическая и вербальная агрессия вместе с раздражительностью), причём, уровень агрессивности преобладает над уровнем враждебности на 14%.

**Выводы.** Результаты проведенного исследования полезны респондентам для построения и реализации межличностных отношений, а также для создания тактики общения в новых, возможно, конфликтных или стрессовых ситуациях, когда высок риск проявления агрессии. Обязательная рефлексия того факта, что в проявлении агрессии чаще проявляется вербальная агрессия, позволит полноценно выстроить бесконфликтное общение

## ЛИТЕРАТУРА

1. Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль/ Л. Берковиц; под ред. Л. Берковиц. – Санкт-Петербург: Изд-во Питер, 2012. – с.240.
2. Зайцев, Ю. А., Кузнецова, Ю. А., Хван, А. А. Стандартизация опросника А. Басса и А. Дарки / Ю. А. Зайцев, Ю. А. Кузнецова, А. А. Хван, // Психологическая диагностика: учеб. пособие / А.А. Хван. – Кемерово, 2008. – С.35–38
3. Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д. Я. Райгородский; под ред. Д. Я. Райгородского. – Самара: Изд-во «БАХРА-М», 2001. – с.672.

## ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО РАКА ПЕЧЕНИ

Валаханович П. Д.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: к.м.н., старший преподаватель, Лагодская И. Я.

**Актуальность.** Согласно статистике, в 2020 году количество новых выявленных случаев злокачественных опухолей в Беларуси оказалось на 13000 меньше, чем в 2019 году. Предполагается, что на показатели количества случаев онкологии повлияли события, связанные с пандемией. А именно, приостановились программы скрининга, уменьшилось количество обращений граждан в организации здравоохранения. Ежегодно регистрируется около одного миллиона новых случаев заболевания. Актуальность работы обуславливается постоянным обновлением медицинской информации, что требует сопоставления научных данных с клиническими случаями.

**Цель.** В качестве цели работы представлено изучение предраковых состояний, описание морфологической верификации и установлением частоты встречаемости первичного и вторичного рака печени согласно данным биопсийного исследования в г.Гродно за 2017 год.

**Методы исследования.** В работе использовались комплексный (описательный и эмпирический) метод и метод сбора данных (контролируемого отбора).

**Результаты и их обсуждение.** За 2017 год в г.Гродно выявлен 151 случай злокачественных новообразований в печени, из них 96 (63,57%) у мужчин, 55 (36,42%) у женщин. Частота встречаемости рака печени преобладает в возрастной группе 50-59 лет (35%) у обоих полов. Большинство злокачественных опухолей печени являются вторичные новообразования – 108 (71,52%), где первичный очаг локализован в кишечнике (27,77%), в легких (17,59%), в поджелудочной железе (15,74%), в желудке (14,81%), в молочной железе (6,4%), в матке и предстательной железе (7,4%) и (8,3%) соответственно, злокачественные заболевания лимфатической и кровеносной системы (1,85%).