

4. Резолюция экспертного совета. Практические аспекты диагностики и коррекции калий- и магнийдефицитных состояний / Е. Е. Аверин [и др.] // Кардиология. – 2020. – № 60 (2). – С. 155-164.

5. Gröber, U. Magnesium and Drugs / U. Gröber // Int J Mol Sci. – 2019. – Vol. 20 (9). – P. 20-24.

6. Pathophysiology of Drug-Induced Hypomagnesaemia / P. Katopodis [et al.] // Drug Saf. – 2020. – Vol. 43 (9). – P. 867-880.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ К ЭКСТРЕННОМУ КЕСАРЕВУ СЕЧЕНИЮ У ПЕРВОРОДЯЩИХ И ЖЕНЩИН С ПОВТОРНЫМ ОПЕРАТИВНЫМ РОДОРАЗРЕШЕНИЕМ

Лукша А. Н., Мишкова А. П.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: к.м.н., доцент Заборовский Г. И.

Актуальность. Кесарево сечение (КС) – одна из самых распространенных операций в акушерской практике, имеющая огромное значение, так как при осложненном течении беременности и родов оно позволяет сохранить здоровье и жизнь матери и ребенка. При наличии показаний к КС во время беременности предпочтительнее осуществлять операцию в плановом порядке, так как доказано, что число осложнений для матери и ребенка при этом значительно меньше, чем у подвергшихся экстренным вмешательствам [1].

КС в определенной мере снижает перинатальную смертность, упрощает родоразрешение в пограничных с нормой ситуациях (тазовое предлежание плода, экстрагенитальные заболевания, преэклампсия, крупный плод, оперированная матка), отличается более высокой стоимостью операции по сравнению с самопроизвольными родами. За последние 30 лет сложился определенный стереотип мышления у врачей и пациенток: КС в любой ситуации – это оптимальный метод родоразрешения для плода [2]

Цель. Провести сравнительный анализ показаний к КС у первородящих женщин и с повторным оперативным родоразрешением

Методы исследования. В работе использовали аналитический и статистический методы. Исследование основано на анализе выкопированных сведений из медицинской документации родильных домов. Изучены материалы 30 пациенток с впервые проведенным экстренным оперативным родоразрешением и 30 пациенток с повторным КС

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования выявлены основные показания для проведения операции КС у первородящих, среди которых преобладают: преждевременный разрыв околоплодных оболочек (42,1%, $p < 0,05$), дистресс плода (21,1%, $p > 0,05$), первичная слабость

родовой деятельности (18,4%, $p < 0,05$), клинически узкий таз и тазовое предлежание (13,2%, $p < 0,05$), отслойка нормально расположенной плаценты и обвитие пуповины (5,2%, $p > 0,05$). Среди женщин с повторным оперативным родоразрешением преобладающими показаниями являются: рубец на матке (27,8%, $p < 0,05$), выпадение пуповины (25,0%, $p < 0,05$), преждевременный разрыв околоплодных оболочек (19,4%, $p < 0,05$), дистресс плода (16,7%, $p > 0,05$) и преэклампсия (11,1%, $p > 0,05$).

Выводы. На основе полученных результатов можно констатировать, что в обеих исследуемых группах спектр показаний для операции был достаточно широким, поэтому на современном этапе основными способами снижения частоты КС, а, следовательно, и уменьшения риска послеоперационных осложнений, являются: роды через естественные родовые пути у беременных с рубцом на матке; профилактика аномалий родовой деятельности и дородового разрыва плодных оболочек. Использование современных методов диагностики, профилактики, лечения осложнений беременности, рациональное ведение родов, согласно клиническим протоколам, должны стать альтернативой увеличению числа экстренного оперативного родоразрешения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вученович, Ю. Д. Кесарево сечение: границы рисков и безопасности / Ю. Д. Вученович, А. С. Оленев, В. А. Новикова, В. Е. Радзинский // Акушерство и гинекология: новости мнения, обучение. – 2019. – Т. 7. – № 3. – С. 93-101. – DOI: 10.24411/2303-9698-2019-13014. – Дата доступа 29.01.2022.

2. Жаркин, Н. А. Кесарево сечение: медицинские, социальные и морально-этические проблемы / Н. А. Жаркин, Л. С. Логутова, Т. Г. Семихова // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2019. – Т. 19. – № 4. – С. 5-10. – <https://doi.org/10.17116/rosakush2019190415>. – Дата доступа 10.01.2022.

АНАЛИЗ ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ С ДИАГНОЗОМ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

Лычковская М. А.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: к.м.н., доцент Васильев А. В.

Актуальность. Цирроз печени – это хроническое заболевание, которое сопровождается структурными нарушениями за счет перехода паренхиматозной ткани печени в фиброзную (соединительную ткань). Как итог: развитие печеночной недостаточности и портальной гипертензии. Беларусь заняла третье место по увеличению стандартизированного по возрасту показателя смертности от цирроза печени из 195 стран и территорий, в связи с чем данная тема является крайне актуальной.