

Выводы. В соответствии с проанализированными данными можно сделать выводы:

1. Гемангиомы чаще встречаются у девочек (соотношение м:ж 1:1,12).
2. Наиболее часто поступают в стационар с целью лечения гемангиом дети в возрасте от 1 до 6 месяцев (60 пациентов – 37,7%).
3. С большей частотой среди морфологических форм встречаются капиллярные гемангиомы – 102 случая (64,2%).
4. В случае локализации гемангиомы на лице наиболее приемлемым методом лечения является консервативный (медикаментозный – бета-адреноблокаторы) 20 случаев (52,6%).
5. В случае локализации гемангиомы в таких областях тела, как: волосистая часть головы, передняя поверхность грудной клетки, спина, верхняя и нижняя конечности, передняя брюшная стенка более приемлем оперативный метод лечения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ковальчук, В. И. Детская хирургия: учебник / В. И. Ковальчук. – Минск : Новое знание, 2020. – 668с.
2. Эффективность лечения бета-адреноблокаторами гемангиом у детей: Бюллетень науки и практики / Э. Ш. Алымбаев, К. А. Узакбаев, Д. А. Ааматов – М. : 2019. -Т. 5, № 11. – С.115-119.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ У ПАЦИЕНТОВ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Савульская В. А., Толкачева В. В.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: Патюпо Е. О.

Актуальность. Рак прямой кишки – злокачественная опухоль, дистальный край которой располагается ниже 12 см от кожно-анальной линии при жесткой ректоскопии (исключая опухоли анального канала). В Республике Беларусь отмечена тенденция к росту заболеваемости раком прямой кишки. На данную локализацию приходится 4-6% от всех онкологических заболеваний и 30-40% от злокачественных новообразований толстой кишки. В 2016 г. в Беларуси рак прямой кишки выявлялся чаще всего на второй стадии (44,8%), на долю запущенных случаев пришлось 37,3% от всех выявленных пациентов [1].

Наиболее часто рак прямой кишки обнаруживается в возрасте 60 лет, однако он может возникать и в более молодом возрасте. Женщины и мужчины заболевают раком прямой кишки с одинаковой частотой. Данное заболевание

чаще встречается в экономически развитых странах и среди городского населения.

Цель. Проанализировать эпидемиологические особенности рака прямой кишки у пациентов в Гродненской области.

Методы исследования. Нами был произведен анализ данных 1000 пациентов, у которых был выставлен диагноз «рак прямой кишки» за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2020 г. Данные пациентов получены из канцеррегистра Гродненской области и программы «4D Client» с госпитальной информационной системой «eDoctor». Пациенты были разделены в зависимости от пола, возраста, места жительства, стадии и распространенности заболевания, гистологической картины.

Результаты и их обсуждение. В результате обработки данных было установлено, что диагноз рак прямой кишки выставлен у 571 мужчины (57,1%) и 429 женщин (42,9%), что указывает на отсутствие значимого различия по половому признаку в данной группе. Средний возраст заболевших среди мужчин – 66-67 лет, у женщин – 64-65 лет. Среди пациентов преобладало городское население – 695 человек (69,5%). По локализации опухоли чаще был поражен нижнеампулярный отдел прямой кишки (511 человек (51,1%)), в верхнеампулярном отделе опухоль была расположена у 325 человек (32,5%), в среднеампулярном отделе – у 163 пациентов (16,3%). В 1 стадии заболевания рак прямой кишки выявлен у 150 человек (15%), во 2 стадии – у 515 (51,5%), в 3 стадии – 195 (19,5%), в 4 стадии – 140 пациентов (14%). Таким образом, количество запущенных случаев составило треть от всех установленных диагнозов. При этом отдаленные метастазы в половине случаев выявлены в печени, также наблюдались метастазы в легких, забрюшинных лимфатических узлах, костях, головном мозге, надпочечниках. По данным гистологического исследования, установлена глубина инвазии опухоли: интраэпителиальный рак обнаружен у 5 пациентов (0,5%), опухоль с поражением подслизистого слоя – у 50 пациентов (4,9%), мышечного слоя – у 155 пациентов (15,5%), субсерозной оболочки – у 507 пациентов (50,7%), у 283 человек (28,3%) опухоль врастает в соседние органы. Гистологически наиболее распространенной формой является аденокарцинома – 95% всех случаев, у 45 человек (4,5%) выявлен недифференцированный рак, у 5 (0,5%) – нейроэндокринный рак.

Выводы. По данным нашего исследования, можно сделать вывод, что рак прямой кишки остается актуальной проблемой для жителей Гродненской области. Треть от всех выявленных случаев обнаружены на запущенной стадии, а у половины пациентов опухоль распространялась в субсерозном слое. Раком прямой кишки преимущественно болеют жители городов в возрасте 65 лет. Эпидемиологические данные по раку прямой кишки в Гродненской области совпадают с данными по стране.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований: клинический протокол // Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Минск : Профессиональные издания, 2019. – 139 с.