

зависимости 5 (12,5%). Вредными привычками девочки считают переедание (10 человек – 21,7%), зависимость от сладкого 15 (32,6%) и телефона 22 (47,8%).

На сегодняшний день в школах ведется работа по привлечению детей к посещению спортивных секций. При анализе данных было выявлено, что 22 (55%) мальчиков и 17 (37%) девочек посещают спортивные секции.

Выводы.

1. Большая часть опрошенных подростков не пропускают основные приемы пищи, что обусловлено возможностью организовать режим питания для детей в учреждениях образования.

2. Физическая активность остается приоритетным направлением в формировании принципов здорового образа жизни детей. Организация возможности реализации себя в спорте на высоком уровне, спортивные секции достаточно актуальны и доступны, для детей школьного возраста.

3. Несмотря на активную воспитательную работу с подростками в школе, профилактическую работу лечебно-профилактических учреждений, борьбе с вредными привычками должно уделяться еще большее значение, особенно среди мальчиков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Клиническая диетология детского возраста : рук. для врачей / под ред. проф. Т. Э. Боровик, проф. К. С. Ладодо. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2015. – 720 с.

АНАЛИЗ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ Г. ГРОДНО И ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА

Стрелков О. Г.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: ассистент кафедры ст. преподаватель Бизюкевич С. В.

Актуальность. В Республике Беларусь (РБ) психические и поведенческие расстройства, вследствие употребления алкоголя, представляют актуальную проблему в наркологии, так как данные расстройства приводят не только к значительному сокращению продолжительности жизни человека, но и являются одной из наиболее частых причин смертности в современном мире, а также повышают риск совершения самоубийств. По последним данным в РБ под диспансерным наблюдением врача-нарколога за 2020 год состоит 138,8 человек на 100 тыс. населения, страдающих алкоголизмом и алкогольными психозами [1]. Поэтому необходимо дальнейшее проведение целевых профилактических

мероприятий среди данной группы лиц, а анализ диспансерного наблюдения представляет собой актуальную задачу.

Цель. Провести анализ диспансерного наблюдения пациентов с синдромом зависимости от алкоголя г. Гродно и Гродненского района.

Методы исследования. Исследование проводилось на базе УЗ ГОКЦ «Психиатрия-наркология». Анализировались статистические данные ежемесячных отчетов наркологической службы г. Гродно и Гродненского района за первое полугодие 2020-2021 гг.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования, было установлено, за период с января по июль 2021 года общее количество пациентов состоящих под диспансерным наблюдением (ДН) с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя» снизилось с 5617(89%) человек до 5414(88%), что на 542 (10%) пациента меньше, чем состоявших на диспансерном учете в июне 2020 – 5956(87%) человек. С ДН за первое полугодие 2021 года было снято 1029 (19%) пациентов, что на 307(5,6%) больше, чем в 2020 году – 722(12,1%) человека. В период январь-июнь 2021 отмечается увеличение числа впервые взятых под ДН пациентов с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя» и составляет 462 пациента (8,5%), по сравнению с 2020 годом 398 человек (6,6%).

Выводы. Исследование показало, не смотря на то, что общее количество пациентов с синдромом зависимости от алкоголя состоящих на ДН снизилось за период январь-июль 2021 года, следует отметить недостаточность предпринимаемых мер профилактического характера, о чем свидетельствует рост первично взятых на ДН пациентов с синдромом зависимости от алкоголя.

ЛИТЕРАТУРА

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/zdravooohranenie_2/godovye-dannye/ – Дата доступа: 03.01.2022.

АКУШЕРСКИЙ АНАМНЕЗ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ И НОРМАЛЬНЫМ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА

Стручинская М. А.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: к.м.н., доцент Заборовский Г. И.

Актуальность. Начиная с середины 20 века отмечается резкий рост числа людей, страдающих ожирением, среди которых много женщин. Лишний вес оказывает огромное влияние на различные сферы жизни, включая репродуктивную функцию. Избыточный вес и ожирение – результат