

# ДУОДЕНИТ КАК СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ В УСЛОВИЯХ COVID-19 НА ПРИМЕРЕ УЗ «ГОКБ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ» Г. ГРОДНО

Кременовский П. К., Белаец Д. С.

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хильмончик Н. Е.

**Актуальность.** Все болезни органов пищеварения часто характеризуются хроническим рецидивирующим течением, сопряжены с развитием осложнений и утратой трудоспособности.

Значительным примером выступает дуоденит, который на данный момент является одним из самых распространенных, если не самым распространенным, заболеванием двенадцатиперстной кишки (ДПК), а вместе с гастритом – и всего желудочно-кишечного тракта. Частота регистрации дуоденита у взрослого населения составляет 19,4%, а среди заболеваний органов пищеварения – 30% [1,2]. Непосредственно в общей структуре дуоденитов хронический дуоденит встречается в 94% случаев, а острый – в 6% [3].

**Цель.** Исследовать данные пациентов из «Журнала регистрации эндоскопических исследований, лечебно-диагностических процедур» с дуоденитом как сопутствующей патологией при инфекции Covid-19 и стратифицировать их на группы по полу, возрасту и месту жительства.

**Методы исследования.** Нами проанализирован «Журнал регистрации эндоскопических исследований, лечебно-диагностических процедур» и взято 100 пациентов с выявленным дуоденитом за период с 2020 по 2021 год. Данные пациенты были госпитализированы в Уз «ГОКБ Медицинской реабилитации» г. Гродно с выявленной инфекцией COVID-19. Степень достоверности полученных результатов и выводов обоснована применением традиционных подходов к статистической обработке полученного массива данных с применением методов параметрической и непараметрической статистики.

**Результаты и их обсуждение.** Комплексная методика проведенного исследования включает в себя анализ госпитализированных пациентов по возрасту за 2020 год, из которых: 35-39 лет – 2%, 40-44 лет – 2%, 45-49 лет – 0%, 50-54 года – 0%, 55-59 лет – 4%, 60-64 года – 18%, 65-69 лет – 14%, 70-74 года – 24%, 75-79 лет – 16%, 80-84 года – 12%, 85-89 лет – 8%, 90< лет – 0%; за 2021 год, из которых: 35-39 лет – 0%, 40-44 лет – 2%, 45-49 лет – 0%, 50-54 года – 6%, 55-59 лет – 8%, 60-64 года – 12%, 65-69 лет – 12%, 70-74 года – 16%, 75-79 лет – 16%, 80-84 года – 10%, 85-89 лет – 14%, 90< лет – 4%. Визуализация структурных показателей позволяет наглядно отобразить преимущественную госпитализацию городского населения за 2020 год – 62% и за 2021 год – 76%

соответственно. Притом гендерное соотношение в 2020 году – 58% в пользу женщин; в 2021 году – 52% в пользу мужчин.

У испытуемых на фоне дуоденита и COVID-19 развился хронический гастрит в 88% случаев в 2020 году и 94% в 2021 году. Помимо этого, у испытуемых также наблюдалось развитие ВРВП различной степени 12% в 2020 году и 18% в 2021 году. Дуодено-гастральный рефлюкс развился у 42% испытуемых в 2020 году и у 14% в 2021 году. Полипоз желудка был обнаружен у 12% испытуемых в 2020 году и у 10% в 2021 году.

**Выводы.** Госпитализированная заболеваемость дуоденитом на фоне инфекции COVID-19 за период 2020-2021 гг. в УЗ «ГОКБ Медицинской Реабилитации» г. Гродно наиболее характерна для городских жителей в возрасте 60-74 года в 2020 году и в возрасте 60-79 лет в 2021 году. Анализ гистологической картины показал преимущественно слабую активность воспалительного процесса дуоденита: 90% в 2020 году и 94% в 2021 году. Лимфоидная инфильтрация сопровождала процесс в 100% случаев в обоих годах. При этом в 2020 году в 58% случаев процесс слабо выражен, в 36% – средняя выраженность, 6% – сильная выраженность процесса. В 2021 году – 70% – слабая выраженность процесса, в 30% случаев – средняя выраженность.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Hallerbäck, B. Assessment of Quality of Life among patients with suspected duodenal ulcer / B. Hallerbäck // Scandinavian journal of gastroenterology. – Supplement vol. 199 (1993). – P. 32-3
2. Медведев, В. Н. Взаимосвязь пилорических хеликобактерий с активностью антрального гастрита, гастродуоденита / В. Н. Медведев, Ю. Ф. Кнышев, В. Ф. Орловский // Клини. мед. – 1991. – № 69 (10). – С. 67–70.
3. Валенкович, Л. Н. Клиническая энтерология / Л. Н. Валенкович, О. И. Яхонтова. – СПб., 2001. – 288 с.

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2023 ГОД

**Кретов А. Ю., Якубовская А. И.**

Гродненский государственный медицинский университет

Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Сильванович С. А.

**Актуальность.** Актуальность данной темы обусловлена зависимостью устойчивого развития Республики Беларусь от избранных направлений денежно-кредитной политики.

**Цель.** Раскрыть основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь в 2023 г.